

速効主義。



虫が出たら迷わず一撃。
即戦力の殺虫剤。

未成熟
とうもろこしに
ツマジロクサヨトウ
を追加
適用拡大



アファーム®

乳剤

syngenta®

シンジェンタ ジャパン株式会社

農薬をご使用の際は、ご購入先、または当社ウェブサイトなどで最新の登録内容をご確認ください。

®はシンジェンタ社の登録商標

農家の常備薬「アファーム乳剤」なら…

- 作物の生育時期を選ばず、害虫の発生に応じた使用が可能。確実な効果が期待できます。
- ハスモンヨトウ、オオタバコガなどの大型チョウ目に、速効効果があります。
- 薬害のリスクが少なく、安心して使えます。
- コナガ、アザミウマ類、ダニ類、ハモグリバエ類など、複数の害虫を同時防除。
- 適用作物も60種類以上と幅広く使えます。

アファーム
農家の常備薬

特設ページは
こちら 



**適用
拡大**

■ 適用害虫と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量(ℓ/10a)	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エマメクチン 安眠剤を含む 農薬の併用回数
みかん	アザミウマ類 ミカンハモグリバエ	1000~2000	200~700	収穫3日前まで	2回以内	散布	2回以内
	ツマジロクサヨトウ						
未成熟とうもろこし	オオタバコガ ヨトウムシ	1000~2000	200~700	収穫30日前まで	2回以内	散布	2回以内
とうもろこし(子実) ヤングコーン							
かんしょ	ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ	2000	200~700	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
えだまめ							
さやいんげん	ハモグリバエ類	2000	200~700	収穫3日前まで	2回以内	散布	2回以内
さやえんどう							
豆類 (未成熟、ただし、 さやいんげんを除く)	ハモグリバエ類	1000~2000	200~700	収穫3日前まで	2回以内	散布	2回以内
すいか							
きゅうり	アザミウマ類 ウリノメイガ	2000	200~700	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
	アザミウマ類 ハスモンヨトウ ハモグリバエ類						
ズッキーニ にがうり	オオタバコガ	1000~2000	200~700	収穫3日前まで	2回以内	散布	2回以内
うり類(漬物用)							
メロン	アザミウマ類 ウリノメイガ	2000	200~700	収穫3日前まで	2回以内	散布	2回以内
	アザミウマ類 ハモグリバエ類						
トマト ミニトマト	アザミウマ類 ウリノメイガ	1000~2000	200~700	収穫前日まで	5回以内	散布	5回以内
	アザミウマ類 ハモグリバエ類						
なす	アザミウマ類 ハモグリバエ類 チャノホコリダニ ハダニ類	2000	200~700	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
	オオタバコガ ハスモンヨトウ						
ピーマン	コナジラミ類	100~300	200~700	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内
とうがらし類							
キャベツ	コナガ アオムシ ヨトウムシ	1000~2000	200~700	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
	タマナギンウバ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ						
レタス 非結球レタス	ハスモンヨトウ オオタバコガ ナモグリバエ	1000~2000	200~700	収穫3日前まで	3回以内	散布	2回以内
はくさい							
だいこん	コナガ アオムシ ヨトウムシ	2000	200~700	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
	コナガ アオムシ						
カリフラワー	コナガ アオムシ アザミウマ類 オオタバコガ	1000~2000	200~700	収穫3日前まで	3回以内	散布	3回以内
ブロッコリー							
なばな類	コナガ アオムシ ヨトウムシ	1000~2000	200~700	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内
	ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ						
のさわな チンゲンサイ	アオムシ コナガ	2000	200~700	収穫3日前まで	3回以内	散布	3回以内
ハセリ							
こまつな	ハスモンヨトウ コナガ	1000~2000	200~700	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
非結球あぶらな科 葉菜類 (のさわな、 チンゲンサイ、 こまつなを除く)							
セルリー	ハモグリバエ類 オオタバコガ タバコガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ	2000	200~700	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
	シロイチモジヨトウ ハモグリバエ類						
ねぎ	シロイチモジヨトウ	1000~2000	200~700	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
	ハモグリバエ類						
わけぎ あさつき	シロイチモジヨトウ	1000~2000	200~700	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
しゅんぎく							
エンダイブ	オオタバコガ ハスモンヨトウ	2000	200~700	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
すいぜんしな							
みつば	タマナギンウバ ハモグリバエ類 アザミウマ類 ヨトウムシ	2000	200~700	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内
	ハスモンヨトウ オオタバコガ						
しそ	ハダニ類 キアゲハ ヨトウムシ ハスモンヨトウ	1000~2000	200~700	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内
	ハダニ類 シンサビダニ						
いちご	オオタバコガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ ハダニ類	100~300	200~700	収穫前日まで	5回以内	散布	5回以内
	オクラ						
アスパラガス	オオタバコガ ハスモンヨトウ ヨトウムシ	1000	200~700	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
ほうれんそう							
かぶ	コナガ	1000	200~700	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
トレビス							
非結球メキャベツ にしんじ	ハスモンヨトウ ハモグリバエ類	1000	200~700	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
みょうが(花穂)							
みょうが(茎葉)	ハダニ類	2000	200~700	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
エンサイ							
メキャベツ	ハスモンヨトウ	1000	200~700	収穫3日前まで	3回以内	散布	3回以内
葉しょうが							
かぼちゃ	アザミウマ類	2000	200~700	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
食用きく							
モロヘイヤ	ハスモンヨトウ	1000~2000	200~700	収穫14日前まで	1回	散布	1回
茶							
茶	チャノホコリダニ ヨモギエダシヤク チャノキノアザミウマ チャノホソガ チャハマキ	1000~2000	200~400	摘採7日前まで	1回	散布	1回
	チャノホコリダニ ハスモンヨトウ						
きく	アザミウマ類	1000~2000	200~700	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
ストック							
マーガレット	オオタバコガ ハスモンヨトウ	2000	200~700	発生初期	5回以内	散布	5回以内
花き類・観葉植物							
花き類・観葉植物	オオタバコガ ハモグリバエ類 ヨトウムシ類	1000	200~700	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
	アザミウマ類						

■ 使用上の注意事項

- ① 蜜に対して影響があるので、周辺の農薬にはかからないようにしてください。
- ② ミツバチおよびマルハナバチ等に対して影響があるので、以下のことに注意してください。
 - 1) ミツバチおよびマルハナバチ等の巣箱およびその周辺にからないようにしてください。
 - 2) 受粉促進を目的としてミツバチおよびマルハナバチ等を放飼中の施設や果樹園などでは、散布直後から1日後まではハチを移動させるか巣門を閉めてください。
 - 3) 関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。
- ③ 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- ④ 適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤をはじめとする場合は、使用者の責任において事前に業者の有無を十分確認してから使用してください。なお、普及指導センター、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- ⑤ 誤飲に注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐かせないで、直ちに医師の手当を受けさせてください。
- ⑥ 原液は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- ⑦ 本剤は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすようにしてください。
- ⑧ 散布の際は保護眼鏡、農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗うがいをしてください。
- ⑨ 本剤は自動車、壁などの塗装面、大理石、御影石に散布液がかかると変色する恐れがあるので、散布液がかからないよう注意してください。
- ⑩ 使用済りの薬液が生じないように調整を行い、使いきってください。散布器具および容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- ⑪ 危険物第四類第二石油類に属するので火気には十分注意してください。
- ⑫ 火気を避け、直射日光が当たらない低温場所に密栓して保管してください。

● 使用前にはラベルをよく読んでください。● ラベルの記載以外には使用しないでください。● 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。● 使用後の空容器は圃場などに放置せず適切に処理してください。

シンジェンタ ジャパン株式会社

〒104-6021 東京都中央区晴海1-8-10 オフィスタワー-X21階
[ウェブサイト] <http://www.syngenta.co.jp>

