

農林水産省登録
第23081号

芝生用除草剤

アシュラスター[®]

液剤

®はシンジェンタ社の登録商標です。

優れた茎葉処理効果で、
キラめくコースをつくる。

1. スズメノカタビラや
広葉雑草に高い効果を示すため、
コースがきれいになります。
2. 散布スケジュールに余裕が持てます。

アシュラスター[®]
液剤

syngenta.

TM

芝生用除草剤 **アシュラスター** **液剤**

◇ 農林水産省登録 第23081号
 ◇ 包 装：1L×12
 ◇ 成 分：アシュラム ……………30.0%
 N'-メキシカルボニルスルファニルアミドナトリウム
 MDBAカリウム塩 ……………3.3%
 2-メキシ-3,6-ジクロロ安息香酸カリウム
 水等……………66.7%
 ◇ 人畜毒性・毒物及び劇物取締法：非該当

■ 特長

- ◇優れた茎葉処理効果がありますので、コースがきれいになります。
- ◇幅広い雑草に効果を示しますので、予算内での雑草管理対策にお役立て頂けます。
- ◇液剤タイプのため、薬液調整が簡単です。

■ 適用雑草の範囲および使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	アシュラムを含む農薬の総使用回数	MDBAを含む農薬の総使用回数
			薬量	希釈水量				
日本芝	一年生雑草	秋冬期 雑草発生初期	0.45～0.75mL/m ²	200～300mL/m ²	3回以内	茎葉散布	3回以内	3回以内

■ 効果・薬害等の注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。
- 本剤の所定量を所定量の水にうすめ、よくかきまぜてから散布すること。
- 高温時及び芽立ち期の散布は一時的に黄化を生ずる恐れがあるので避けること。
- メヒシバ、スズメノカタビラには効果を安定させるため、4～5葉期までに使用すること。
- 本剤は一年生イネ科雑草に対し遅効性で、効果の現れるまでにかなりの時間を要し、散布時期が遅れると効果が劣るので、時期を失しないように散布すること。
- 広葉雑草のうちカタバミには効果が劣るので、それらの優占する所では使用を避けること。
- ベントグラス等の西洋芝では薬害を生ずるのでかからないようにすること。
- 散布薬液の飛散や流出によって、周辺の有用植物に影響を及ぼさないよう十分に注意して散布すること。
- 散布に使った器具類は良く水洗いして、他の用途に使用する時は影響のないように注意すること。
- 雨水が直接河川、かんがい水、農耕地に流れ込むような場所、特に傾斜地では大雨の予想される場合は散布を避けること。
- 水源池に本剤が飛散・流入しないよう十分に注意すること。
- 散布器具、容器の洗浄水及び残りの薬液は河川等に流さず、容器、空瓶等は環境に影響を与えないよう適切に処理すること。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合には病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

■ 安全使用上の注意

- 公園等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払うこと。

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| ●使用前にラベルをよく読んでください。 | ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 |
| ●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。 | ●空容器は圃場などに放置せず、3回以上水洗いし、適切に処理してください。 |

販売
シンジェンタ ジャパン株式会社
 ローン アンド ガーデン事業本部
 〒104-6021 東京都中央区晴海1-8-10 オフィスタワー-X21階
 TEL:03-6221-3802 FAX:03-6221-3899
<http://www.syngenta.co.jp/golf>

取扱い