

農林水産省登録
第20585号

好評発売中

ラージパッチに優れた効果!!

芝用殺菌剤

イカルガ® 35SC

チフルザミド水和剤

500ml入

使いやすい
フロアブルタイプ

芝用殺菌剤

イカルガ®35SC

適用病害の範囲及び使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チフルザミドを含む農薬の総使用回数
芝 (日本芝)	葉腐病 (ラージパッチ) 疑似葉腐病 (春はげ症)	1000～2000倍	発病初期	2回以内	1㎡当り0.3ℓ散布	2回以内
	フェアリーリング病	3000～4000倍			1㎡当り1ℓ散布	
芝 (ベントグラス)	葉腐病 (ブラウンパッチ)	2000倍			1㎡当り0.5ℓ散布	
	フェアリーリング病	3000～4000倍			1㎡当り1ℓ散布	
芝 (ブルーグラス)	雪腐小粒菌核病	1000～2000倍	根雪前		1㎡当り0.3ℓ散布	

⚠ 安全使用上の注意



- 本剤は貯蔵中に分離することがあるので、使用に際しては容器をよく振ってください。
- 本剤の使用にあたっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
- 使用量に合わせて薬液を調整し、使い切ってください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 散布の際は保護眼鏡、農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。
- 作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
- 公園等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。

保管…直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密栓して保管してください。

- 使用前にはラベルをよく読んでください。■ ラベルの記載事項以外には使用しないでください。
- 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。■ 空容器は圃場等に放置せず、適切に処理してください。

取扱い

 日産化学工業株式会社

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-7-1 TEL 03-3296-8021