

新発売

あばれる雑草を一括防除。



土壌処理で先手を打つ！



ウィーデン®WDG



スズメノカタビラ



メヒシバ



アレチノギク



ヒメムカシヨモギ



ウラジロチチコグサ



タンポポ



トキンソウ



ハルジオン



ノボロギク



オオイヌフグリ



トキワバゼ



シロツメクサ



カラスノエンドウ



カタバミ



オオバコ



チドメクサ



ホトケノザ



ヒメオドリコソウ



ウィーデン®WDG

芝生用除草剤(土壌処理型)

NO USE

After use

複数雑草を賢く手堅く一括で。

イネ科雑草から広葉雑草までまとめて防除。

安定した土壌処理層を形成して、雑草を長期間抑制します。

ウィーデン®WDGの特長

コースの雑草管理をよりシンプルに、より便利に。

1

幅広い除草スペクトラム

一年生雑草および多年生広葉雑草に対して優れた除草効果を示します。

- イネ科雑草：スズメノカタビラ、メヒシバなど
- キク科雑草：タンポポ、アレチノギク、ヒメムカシヨモギ、ウラジロチチコグサ、トキンソウ、ハルジオン、ノボロギクなど
- ゴマノハグサ科雑草：オオイヌノフグリ、トキワハゼなど
- マメ科雑草：シロツメクサ、カラスノエンドウなど
- その他、カタバミ、オオバコ、チドメグサ、ホトケノザ、ヒメオドリコソウなど
幅広く安定した土壌処理効果を示します。

2

残効性に優れています。

イネ科雑草に対しては、一年間を通じて、120日の残効性、広葉雑草に対しては、春処理で90日、秋処理で120日の残効性が期待できます。

3

一年間を通じて、使用できます。

日本芝（コウライシバ、ノシバ）に対して、優れた安全性を示しますので、日本芝の萌芽期、生育期、生育終期、休眠期、いずれにおいても使用できます。

4

使いやすい製剤

粒径が大きい水和剤で、粉立ちが少なく、水に溶けやすい使い勝手に優れた製剤です。
500g包装で、1,000Lタンクに1包装分投入することで5,000㎡散布することができます
(1㎡あたり0.1gの製剤を水量200mlで散布する場合)。

ウィーデン®WDG 殺草スペクトラム

(日本植物調節剤協会委託試験結果および社内試験結果より)

科名	和名	発生前処理薬量	
		0.075g/m ²	0.1g/m ²
イネ科	メヒシバ	●	●
	スズメノカタビラ	●	●
キク科	ウラジロチチコグサ	●	●
	チチコグサモドキ	●	●
	チチコグサ	●	●
	ハハコグサ	●	●
	セイヨウタンポポ	-	●
	ブタナ	-	●
	ニガナ	-	◎
	オオアレチノギク	●	●
	アレチノギク	●	●
	ヒメムカシヨモギ	●	●
	ヨモギ	●	●
	ハルジオン	●	●
	ノボロギク	◎	●
	トキンソウ	○	●
マメ科	ハキダメギク	●	●
	シロツメグサ	●	●
	カラスノエンドウ	●	●
	コメツブウマゴヤシ	●	●
	ヤハズソウ	△	△


科名	和名	発生前処理薬量	
		0.075g/m ²	0.1g/m ²
ゴマノハグサ科	オオイヌノフグリ	●	●
	タチイヌノフグリ	○	●
	トキワハゼ	●	●
アブラナ科	タネツケバナ	●	●
	ナズナ	○	●
	イヌガラシ	●	●
ナデシコ科	オランダミミナグサ	●	●
	ミミナグサ	●	●
	ハコベ	◎	●
	ツメクサ	●	●
カタバミ科	カタバミ	◎	●
オオバコ科	オオバコ	○	●
セリ科	チドメグサ	●	●
トウダイグサ科	コニシキソウ	◎	●
スベリヒユ科	スベリヒユ	●	●
シソ科	ホトケノザ	●	●
カヤツリグサ科	カヤツリグサ	●	●
	ハマスゲ	×	△
	ヒメクグ	×	×

●：十分な効果 ◎：高い効果 ○：効果あり △：効果不十分 ×：効果なし —：未実施、試験中

ウィーデン®WDG の威力は一目瞭然。


タフな春～夏管理の労力を軽減したい。そんな現場の声にお応えします。

● ウィーデンWDGの試験結果（日植調・春処理） 平成19年度試験



秋処理で翌春の雑草を抑えることで、ゆとりの防除計画が組めます。

● ウィーデンWDGの試験結果（日植調・秋処理） 平成19年度試験



■ 適用と使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の 使用回数	使用方法	オキサジクロメホン を含む農薬の 総使用回数	ヨードスルフロン メチルナトリウム塩 を含む農薬の 総使用回数
			薬量	希釈水量				
日本芝	一年生雑草 および 多年生広葉雑草	雑草 発生前	75~100 g/10a	200~300 ℓ/10a	2回以内	全面散布	2回以内	2回以内

種 類 オキサジクロメホン・ヨードスルフロンメチルナトリウム塩水和剤

名 称 ウィーデン®WDG

性 状 類白色水和性細粒

有効成分の
種類および
含有量

オキサジクロメホン……………30.0%
 (3-[1-(3,5-ジクロロフェニル)-1-メチルエチル]-3,4-ジヒドロ-6-メチル
 -5-フェニル-2H-1,3-オキサジン-4-オン)

ヨードスルフロンメチルナトリウム塩……2.0%
 (メチル-4-ヨード-2-[3-(4-メトキシ-6-メチル-1,3,5-トリアジン-2-イ
 ル)ウレイドスルホニル]安息香酸、ナトリウム塩)

その他の成分の種類及び含有量
 (鉱物質微粉、界面活性剤等)……………68.0%

化学物質
管理促進法
(PRTR)

第一種指定化学物質 政令番号 172
オキサジクロメホン……………30.0%

安全
性

●人畜毒性：普通物（製剤）

急性毒性	急性経口	ラット(♀)	LD ₅₀ >2,000mg/kg
	急性経皮	ラット(♂♀)	LD ₅₀ >2,000mg/kg
局所効果	皮膚刺激性	ウサギ	刺激性なし
	眼刺激性	ウサギ	中等度の刺激性あり
感 作 性		モルモット	感作性なし

●魚毒性：A類相当（製剤）

水産動植物に 対する影響	コイ	LC ₅₀ >1,000mg/L (96時間)
	オオミジンコ	EC ₅₀ >1,000mg/L (48時間)
	藻類	ErC ₅₀ 2.78mg/L (0-72時間)

⚠ 効果・薬害等の注意

- 雑草の発生前に有効なので時期を失ないように散布して下さい。
- 十分に活着した日本芝に使用して下さい。
- 寒冷地型芝生に使用しないで下さい（薬害）。
- 芝に黄変などの薬害を生じることがありますが、1〜2週間で回復し、その後生育には影響を与えません。
- 散布時は芝生の中にある草花や花木、作物など周辺作物に薬液がかからないように散布して下さい（薬害）。

- ライグラスに対して薬害を生じやすいので、ライグラスの周辺やライグラスに直接薬液がかからないように注意して下さい。
- 散布に用いた器具類は使用後できるだけ早く水で十分洗っておき、他の用途に使用する場合は、薬害の原因にならぬよう注意して下さい。
- 使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

⚠ 安全使用上の注意

- 誤飲などのないよう注意。誤って飲み込んだ場合は吐き出させ、直ちに医師の処置を受けさせて下さい。
- 散布液調整時及び散布時は保護メガネを着用して薬液が眼に入らないよう注意して下さい。眼に入った場合には直ちに水洗し眼科医の処置を受けて下さい（刺激性）。
- 散布時は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用し作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗顔・うがいをして下さい。
- かぶれやすい人は取扱いに十分注意下さい。

- 公園等で使用する場合は、散布中および散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払って下さい。
- 使用量に合わせて液剤を調製し、使い切ってください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載内容以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届くところには置かないでください。
※空容器は圃場に放置せず、環境に影響のないように適切に処理してください。

販売取扱店

製 造

バイエルクロップサイエンス株式会社
エンバイロサイエンス事業本部

〒100-8262 東京都千代田区丸の内1-6-5 www.bayercropscience.co.jp

販売元

株式会社 理研グリーン

〒110-0005 東京都台東区上野2丁目12-20 NDKロウタスビル TEL.03-3833-6321 FAX.03-3833-6325

札幌駐在 TEL.011(756)3891 FAX.011(758)1227
 仙台支店 TEL.022(222)9599 FAX.022(267)6505
 東京支店 TEL.03(3835)8134 FAX.03(3835)8136
 静岡支店 TEL.054(283)5555 FAX.054(284)1769
 名古屋支店 TEL.052(218)3060 FAX.052(218)3061

大阪支店 TEL.06(6871)1691 FAX.06(6871)1811
 福岡営業所 TEL.092(752)8391 FAX.092(752)8392
 グリーン研究所 TEL.0538(58)1282 FAX.0538(58)1714
 福岡工場 TEL.0538(55)5108 FAX.0538(55)5104

<http://www.rikengreen.co.jp>