

チョウ目とコガネムシ類幼虫を
同時防除！



製品規格：250ml×2本

®：(株)理研グリーンの登録商標です。

製造元



株式会社 理研グリーン

エスペランサ®の特長

1. チョウ目害虫、コウチュウ目害虫どちらにも高い効果・残効性を示します
2. 優れた浸透移行性により残効性が長い
3. 人や環境にやさしい薬剤です


人畜毒性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）



各種害虫に対する防除効果


（社）日本植物防疫協会委託試験成績

【シバツトガ】



東日本グリーン研究所 平成22年7月30日処理 8月10日調査
発生状況：中発生（幼虫発生初期）

【コガネムシ類幼虫】



新中国グリーン研究所 平成22年5月20日処理 6月17日調査
発生状況：中発生（幼虫発生初期）

適用害虫および使用方法

（平成26年5月16日現在）

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	使用方法	総使用回数※
芝	スジキリヨトウ シバツトガ コガネムシ類幼虫	4000 倍 （薬量として 0.05ml/㎡）	200ml/㎡	発生前～ 発生初期	散布	3 回以内

※本剤およびシアントラニプロールを含む農薬の総使用回数



効果・薬害等の注意

- ・使用前に容器をよく振り、均一な状態にする（沈殿）
- ・使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
- ・石灰硫黄合剤、ボルドー液等とは混用しない（分解）
- ・散布液調製後は速やかに使用する（分解）
- ・過度の連用をさけ、可能な限り作用性の異なる薬剤やその他の防除手段を組み合わせる。
- ・使用量、使用時期、使用方法を守る。特に初めて使用する場合や異常気象時は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをお勧めします。



安全使用上の注意

- ・誤飲に注意。
- ・散布時は、手袋、長ズボン・長袖作業衣などを着用し、皮膚に付着しないよう注意する。
- ・桑にはかからないように散布する（蚕害）
- ・公園等で使用する場合は、散布区域に縄囲いや立て札を立て、散布中および散布後（最小限その当日）に関係者以外立ち入らせない。小児、人畜等に留意する。

魚毒性等…散布器具・容器の洗浄水は、河川等に流さない。また、空容器は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する。

保管……密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼・乾燥した所。

●ラベルをよく読む。●記載以外には使用しない。●小児の手の届く所に置かない。●空容器は圃場などに放置せず、3 回以上水洗し、環境に影響のないよう適切に処理すること。洗浄水はタンクに入れること。

緑をつくり、育て、守る。

販売元



株式会社 理研グリーン

〒110-8520 東京都台東区東上野 4-8-1 TIXTOWER UENO 8階

TEL.03-6802-8571 FAX.03-6802-8577 <http://www.rikengreen.co.jp>

札幌駐在 TEL.011-595-7401 FAX.011-595-7402 大阪支店 TEL.06-6871-1691 FAX.06-6871-1811
仙台支店 TEL.022-222-9599 FAX.022-267-6505 福岡営業所（大阪支店にて代行受付）
東京支店 TEL.03-6802-8943 FAX.03-6802-8953 グリーン研究所 TEL.0538-58-1282 FAX.0538-58-1714
静岡支店 TEL.054-283-5555 FAX.054-284-1769 福田工場 TEL.0538-55-5108 FAX.0538-55-5104
名古屋支店 TEL.052-218-3060 FAX.052-218-3061

（株）理研グリーン・パートナーショップ