

先手の攻防、
ナイト
騎士で制す。

芝専用殺菌剤

クルセイダー[®]
フロアブル

農林水産省登録
第21278号

ラージパッチ・春はげ症をはじめ、幅広い病害を同時に防除！



Bayer Environmental Science



クルセイダー®

フロアブル

ナイト

先手の攻防、騎士で制す



ラージパッチを中心に 多くの日本芝の病害に 効果があります。



春はげ症



ラージパッチ



ゾイシアディクライン



さび病



カーブラリア葉枯病



象の足跡

適用病害と使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数(倍)	使用時期	使用方法	本剤の使用回数	テブコナゾールを含む 農薬の総使用回数
日本芝	カーブラリア葉枯病	1,000	発病初期	1㎡当り 0.25ℓ 散布	6回以内	6回以内
		2,000		1㎡当り 0.5ℓ 散布		
	葉腐病(ラージパッチ)	400		1㎡当り 0.1ℓ 散布		
	立枯病(ゾイシアディクライン) さび病 疑似葉腐病(象の足跡)	1,000	休眠期前	1㎡当り 0.25ℓ 散布		
	疑似葉腐病(春はげ症)	2,000		1㎡当り 0.5ℓ 散布		
西洋芝 (フルーグラス)	ダラースポット病	1,000	発病初期	1㎡当り 0.25ℓ 散布		
		2,000		1㎡当り 0.5ℓ 散布		

農薬の種類：テブコナゾール水和剤 物理的・化学的の症状：類白色水和性粘稠懸濁液体

有効成分の種類及び含有量：(RS)-1-p-クロロフェニル-4,4-ジメチル-3-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-イルメチル)ペンタン-3-オール…40.0%

水産動物への影響：コイルC₅₀ 19.3mg/ℓ(96h) オオミジンコEC₅₀ 9.9mg/ℓ(48h) 藻類EbC₅₀ 4.99mg/ℓ(72h) ◎包装：500mℓ×10本

効果・薬害等の注意

- 使用前に容器をよく振ってください。
- はくさい、だいこんにはかからないようにしてください。(薬害)
- 使用量、使用時期、使用方法を守ってください。特にはじめに使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

安全使用上の注意

- 散布時は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖作業衣などを着用してください。
- 作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをし、衣服を換えてください。
- 眼に入らないように注意。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。(刺激性)
- 公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
- 魚毒性…通常の使用方法では問題はありません。
- 保管…密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼な場所に保管してください。

㊞はバイエルグループの登録商標

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載内容以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届くところには置かないでください。
※空容器は圃場に放置せず、環境に影響のないように適切に処理してください。

代理店名

バイエルクロップサイエンス株式会社
エンバイロサイエンス事業本部
〒100-8262 東京都千代田区丸の内1-6-5
www.bayercropscience.co.jp