



グラツチェ[®]

顆粒水和剤

//// 除草剤

芝 用

/// 優れた除草効果

- 一年草、多年草の広葉雑草・カヤツリグサ科雑草まで幅広いスペクトラム。
- チドメグサ・ヒメグサ・ハマスゲ等の難防除雑草に対して高い効果を発揮。
- 雑草発生前から発生初期まで幅広い処理適期。

/// 芝に対する高い安全性

- 西洋芝、日本芝を問わず使用可能。
- フェアウェイ、ラフ、グリーン周り、ティー等のすべての場面对応。
- 張り付け直後の芝でも安全。
- 散布液調製時の粉立ちや、散布後の芝生の汚れが少ない顆粒水和剤。

さらば雑草!!

コストは低く、用途は多彩。

ゴルフコースの芝地管理の強い味方



グラッチェ®
顆粒水和剤

除 草 剤
芝 用

農 林 水 産 省 登 録
第 2 0 3 9 3 号

雑草の成長サイクルにあわせて、効率的に散布しましょう！



● 適用雑草と使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		使用 方法	本剤および エトキシスルフロンを 含む農薬の 総使用回数
			薬量	希釈水量		
日本芝	一年生広葉雑草	雑草発生前 (芝生育期)	15～30g /10a	200～300ℓ /10a	散布	3回以内
	多年生広葉雑草		30～60g /10a			
	ヒメクグ ハマスゲ	雑草生育初期 (3葉期まで) (芝生育期)	45～75g /10a			
西洋芝 (ペントグラス) (ブルーグラス)	一年生および 多年生広葉雑草		30～60g /10a			
	ヒメクグ ハマスゲ		45～75g /10a			

● 芝に対する安全性

芝 種		薬害の発生状況・施用薬量 (g/m ²)				
		0.03	0.06	0.12	0.24	0.48
試験A	播種したノシバ	無	無			
	播種したペントグラス	無	生育抑制*			
	播種したケンタッキブルーグラス	無	無			
	播種したイタリアンライグラス	無	無			
試験B	完成したコウライシバ	無	無	無	無	無
	完成したノシバ	無	無	無	無	無
	完成したペントグラス	無	無	無	生育抑制*	生育抑制**
	播種したイタリアンライグラス	無	無	無	無	無

試験A：播種し覆土後、発芽前に薬剤を散布。

*軽微。事実上問題なし。

試験B：完成したターフへ薬剤を散布。

**草丈抑制症状。14日で回復。

(1997年大日本インキ化学工業(株)総合研究所)

△ 効果・薬害等の注意事項

- 本剤は、雑草の発生前から生育初期に有効なので時期を失しないように散布してください。
- 本剤はイネ科雑草には効果が劣るので、イネ科雑草の優占する圃場ではこれに有効な薬剤と組み合わせて使用してください。
- 周辺の作物にかかると薬害が生じますので散布の際は芝生の中にある草花や花木、畑作物に薬液がかからないようその付近での散布は避けてください。
- 本剤の散布に用いた器具類は、使用後できるだけ早く水で十分洗っておき、他の用途に使用する場合薬害の原因にならないよう注意してください。
- 本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合や、異常気象時は病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

△ 安全使用上の注意事項

- 誤飲、誤食等のないよう注意してください。
 - 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないように注意し、眼に入った場合には直ちに水洗し眼科医の手当を受けてください。使用後は洗眼してください。
 - 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖作業衣などを着用し、散布液を浴びたり吸い込んだりしないように注意してください。
 - 空袋は圃場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。
- 保管…密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷蔵・乾燥した所に保管してください。
- 農薬の空袋等の処理は、関係法令を遵守し、廃棄物処理業者に処理を委託する等により適切に行ってください。



Bayer

バイエル クロップサイエンス株式会社
エンバイロサイエンス事業部
〒100-8262 東京都千代田区丸の内1-6-5

【お客様相談室】 ☎ 0120-575-078 FAX : 03-3218-3068
【ホームページ】 www.environmentalscience.bayer.jp



種類名：エトキシスルフロ水和剤
成分：エトキシスルフロ…60.0%
鉱物質微粉、界面活性剤等…40.0%
性状：褐色水和性細粒