

シバキープセーバー 水和剤

農林水産省登録 第24243号
成分：イマズスルフロン 40.0%
性状：類白色水和性粘稠懸濁液体
毒性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）
包装：500mℓ×8本



適用雑草と使用方法

※本剤及び本有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		使用方法	総使用回数*
			薬量	希釈水量		
日本芝	一年生及び多年生 広葉雑草	芝生育期 (雑草発生前)	200～400 mℓ/10a	200～300 ℓ/10a	全面土壌散布	3回以内
	一年生広葉雑草 ヒメクダ				雑草茎葉散布 又は 全面散布	
日本芝 (こらしいしば)	多年生広葉雑草	芝生育期 (雑草発生初期)				
西洋芝 (ゾルークラス)	一年生広葉雑草		200mℓ/10a			
西洋芝 (ベントグラス)	ヒメクダ					

(2020年12月現在の登録内容)

注意事項

⚠ 効果・薬害等の注意

- ・使用量に合わせ薬液を調製し、使いきって下さい。
- ・貯蔵しておくとき分離するので、使用の際にはよく振って均一な状態にもどしてから所定量をとり出して下さい。希釈する場合は所定量の水に加えて十分にかくはんして下さい。
- ・雑草発生前及び雑草発生初期に有効なので時期を失しないように散布して下さい。
- ・イネ科雑草に効果が劣るので、イネ科雑草の多い場合はこれに有効な土壌処理剤との混用または体系で使用して下さい（効果）
- ・散布時は芝生の付近にある草花や花木、畑作物などに薬液がかからないようにして下さい（薬害）
- ・張り芝直後の芝には使用しないで下さい（薬害）
- ・散布に用いた器具類は、使用後直ちに洗浄し、他の用途に使用する場合の薬害の原因にならないように注意して下さい。
- ・使用量、使用時期、使用方法を守って下さい。特に初めて使用する場合や異常気象時は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

⚠ 安全使用上の注意

- ・公園などで使用する場合、散布区域に縄囲いや立て札をたて、散布中及び散布後（最小限その当日）に関係者以外は立ち入らせないで下さい。小児、人畜等に留意して下さい。
- ・魚毒性等…散布器具・容器の洗浄水は、河川等に流さないで下さい。また、空容器は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理して下さい。
- ・保管…密栓し、直射日光を避け、食品と区別して、冷蔵・乾燥した所。空容器は圃場などに放置せず適切に処理して下さい。

■使用前にはラベルをよく読んでください。 ■ラベルの記載以外には使用しないでください。 ■小児の手の届く所には置かないでください。



レーンボー薬品株式会社
東京都台東区上野 1-19-10
TEL.(03) 6740-7777 FAX.(03) 6740-7000

SCC GROUP
ほろにきグループ

シバキープセーバー[®]

イマズスルフロン水和剤

Golf Course

日本芝・西洋芝の雑草対策に！

芝生用

除草剤

特長

広葉雑草に幅広い
殺草スペクトラム

ヒメクダ・
チドメグサに効果

西洋芝にも使用できる
(ゾルークラス・ベントグラス)



※注意点：ベントグラスの根の生育を抑制するリスクがあるので灌水に注意して下さい。



懸濁性に優れ
使いやすい
フロアブル剤



レーンボー薬品株式会社



シバキープセイバー 水和剤

殺草スペクトラム (発生前)

	対 象 雑 草	処理量 (ml/m ²)		対 象 雑 草		処理量 (ml/m ²)	
		0.2	0.4			0.2	0.4
キク科	トキンソウ	◎～●	●	マメ科	コマツツツメクサ	○～●	●
	セイヨウタンポポ	□～●	●		ヤハズソウ	□	●
	ヒメムカシヨモギ	□～●	●		カラスノエンドウ	●	●
	ハキタメギク	●	●	シソ科	ホトケノザ	○	●
	セイタカアワダチソウ	□	●		キランソウ	●	●
	オオアレチノギク	●	●	ウコギ科	チドメクサ	○～●	◎～●
	ヒメジョオン	□～●	●		ノチメ	●	●
	マメカミヅル	●	●	カタバミ	カタバミ	◎～●	●
	ヨモギ	●	●	ナス科	ナス	○～●	●
	ノゲシ	●	●	タネツケバナ	タネツケバナ	○～●	○～●
	ウラボシチコグサ	□～●	□～●	オオイヌノフグリ	オオイヌノフグリ	□～○	□～●
	キツネアザミ	●	●	オオバコ	ヒメクダ	●	●
	コオニタビラコ	●	●	カヤツリグサ科	ヒメクダ	●	●
	チチコグサ	●	●	ナス科	フルナスビ	●	●
	ツメクサ	●	●	サギコケ科	トキワハゼ	●	●
	オランダミミナグサ	◎～●	◎～●	イネ科	メヒシバ	□～●	○～●
	ハコベ	●	●	フクロソウ科	アメリカフクロ	●	◎～●
タデ科	イヌタデ	●	●	アカバケ科	アレチマツヨイグサ	●	●
	スイバ	●	●	トウダイグサ科	コニシキソウ	□～○	□～●
	イタドリ	●	●				

評 価	●	◎	○	□	△	×
	極大	極大	大	中	小	無
除草効果	100	99～95	94～90	89～70	69～50	49以下

社内試験結果および
日本植物調節剤研究会委託試験結果より

殺草スペクトラム (発生初期)

	対 象 雑 草	処理量 (ml/m ²)		対 象 雑 草	処理量 (ml/m ²)	0.2	0.4
		0.2	0.4				
キク科	チチコグサ	●	●	マメ科	コマツツツメクサ	○～●	◎～●
	トキンソウ	●	●		シロツメクサ	●	●
	ヨモギ	□	●		カラスノエンドウ	●	●
	ヒメムカシヨモギ	○～●	●		ヤハズソウ	□	◎
	ハキタメギク	●	●	ウコギ科	チドメクサ	○～●	○～●
	セイヨウタンポポ	○～●	◎～●	カタバミ	カタバミ	●	●
	セイタカアワダチソウ	○～●	●	アブラナ科	タネツケバナ	●	●
	アレチノギク	○～●	●	オオバコ	オオバコ	●	●
	オオアレチノギク	◎～●	●		オオイヌノフグリ	□～○	□～●
	フタナ	●	●	カヤツリグサ科	ヒメクダ	○～●	◎～●
	マメカミヅル	●	●	サギコケ科	トキワハゼ	●	●
	タビラコ	◎	●	アカバケ科	マツヨイグサ	□～●	●
	ウラボシチコグサ	□～●	□～●	キンボウケ科	キツネノボタン	●	●
	ヒメジョオン	○～●	●	ハルカネコケ科	ギンコケ	□～●	□～●
	オランダミミナグサ	●	●	トウダイグサ科	コニシキソウ	□～○	○～●
タデ科	ツメクサ	●	●				
	イヌタデ	●	●				
	スイバ	●	●				
	イタドリ	●	●				

評 価	●	◎	○	□	△	×
	極大	極大	大	中	小	無
除草効果	100	99～95	94～90	89～70	69～50	49以下

社内試験結果および
日本植物調節剤研究会委託試験結果より



カタバミ

多年生
広葉雑草



ヒメジョオン

一年生
広葉雑草



ヤハズソウ

一年生
広葉雑草



セイヨウタンポポ

多年生
広葉雑草



チドメグサ

多年生
広葉雑草




ヒメクダ

多年生
広葉雑草

シバキープセイバー 水和剤

ヒメクダ／コマツツツメクサに対する効果

- ◆ ヒメクダ(地下茎由来)に及ぼす 除草効果(発生初期処理)
- ◆ コマツツツメクサに対する効果 (経時変化)



0日(散布日)
残草率 100%



処理10日後
残草率 45%



処理29日後
残草率 0%

枯殺

【社内試験】
場 所：兵庫県宝塚市内 温室
処理日：2013年1月30日
処 理：水量200ml/m² (寝着剤無加用)

【社内試験】
処理日：2006年6月13日
処 理：薬量0.2ml/m² (電動スプレーヤー 水量0.2ℓ/m²)
場 所：東京Aゴルフ場
芝 種：コウライシバ／セミラフ

ベントグラス／ブルーグラスに対する安全性

- ◆ ベントグラスの生育適期 (秋) における過剰量処理時の影響確認

供試薬剤	処理量 / m ²		薬害程度 (処理後日数)	
	薬量	水量	9	31
シバキープセイバー	0.2ml	200ml	-	-
	0.4ml	-	-	-
無処理	-	-	-	-

【社内試験】
場 所：千葉県成田市ナーセリー (借地)
処理日：2019年9月30日
芝 種：ベントグラス (品種：ベントクロス)
刈 高：3.5mm (1～2回刈込/日)
区 制：1区1m²、2反復
処 理：電動スプレーヤー散布



0.2ml

0.4ml

無処理

- ◆ 各種西洋芝における倍量薬害試験 (ポット試験)

芝 種	供試薬剤	処理量 / m ²		薬害程度 (処理後日数)			
		薬量	水量	7	14	28	40
ベントグラス	シバキープセイバー	0.2ml	200ml	-	-	-	-
	無処理	0.4ml	400ml	-	-	-	-
ケンタッキーブルーグラス	シバキープセイバー	0.2ml	200ml	-	-	-	-
	無処理	0.4ml	400ml	-	-	-	-

【社内試験】
場 所：兵庫県宝塚市内 温室
処理日：2019年3月28日
芝 種：ベントグラス (品種：ベントクロス)
生育期、刈高5mm
ケンタッキーブルーグラス (品種：クランド) 生育期、刈高7mm
処 理：ハンドスプレー (寝着剤無加用)

安全性を確認した他のベントグラス供試品種 (ポット播種・ターフ形成後、薬剤処理36日後)：

007、L-93、T-1、A-2、バラクーダ、シャーク