



殺菌剤

農林水産省登録
第24180号

シバンバ[®]PRO

フロアブル

[®]はシンジェンタ社の登録商標です。

ラージパッチをはじめ
日本芝の病害対策に
安定感アップ!!

この効果と使いやすさを実感してください



シバンバ[®]PRO
フロアブル

syngenta[®]



殺菌剤

シンバンバ® PRO

フロアブル

- 農林水産省登録：第24180号
- 有効成分：アゾキシストロビン18.0%
ヘキサコナゾール15.3%
- 包装：1L×10本
- 毒物および劇物取締法：非該当
- 作用機構分類番号(RAC番号)：殺菌剤分類 11,3

適用病害 の範囲及び 使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	アゾキシストロビン を含む農薬の 総使用回数	ヘキサコナゾール を含む農薬の 総使用回数
日本芝	葉腐病 (ラージパッチ)	250～ 333倍	100mL/㎡	発病前～ 発病初期	2回以内	散布	8回以内	4回以内
		疑似葉腐病 (象の足跡)	500～ 666倍	200mL/㎡				
	カーブラリア葉枯病		250～ 333倍	100mL/㎡				
	ダラスポット病							
	立枯病 (ゾイシアデクライン)	500～ 666倍	200mL/㎡	休眠期前～ 発病初期				
	疑似葉腐病 (春はげ症)			休眠期前				
	ネクロティックリング スポット病							

効果・薬害 等の注意

- 本剤は貯蔵中に分離することがあるので、使用に際しては容器をよく振ってから使用してください。
- 使用量に合わせ薬剤を調製し、使い切ってください。
- 寒地型西洋芝のグリーンには薬害を生じるおそれがあるので、付近にある場合にはかからないように注意してください。
- りんごの一部品種(あかね、旭、ガラ、きざし、モーリースデリシャス、ラリタン等)では、葉にネクロシス(褐変)や落葉、また果実にはさび果や落果を伴う品種特有の激しい薬害が生じるので飛散(ドリフト)等により散布液がかからないよう十分注意してください。
また、本剤を使用した散布器具及び希釈液タンクを用いて、りんごのこれら品種には散布しないように注意してください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないように注意してください。
- きゅうり、キャベツ、トマト、だいず、いんげんまめには薬害を生じるおそれがあるので、周辺にそれらの作物がある場合にはかからないように注意してください。
- 耐性菌の出現を防ぐため、過度の連用をさけ、なるべく作用性の異なる薬剤と組み合わせて輪番で使用してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。

安全使用上 の注意

- 誤飲などのないよう注意してください。
誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせるようにしてください。
本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 散布液調製時及び散布の際は保護眼鏡、農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。
作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをしてください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係ない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
水産動植物に関する注意：使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきるようにしてください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないようにしてください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないように適切に処理してください。

- 使用前にラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
- 使用後の空容器は圃場などに放置せず適切に処理してください。

販売

シンジェンタ ジャパン株式会社
プロフェッショナル ソリューション事業本部

〒104-6021 東京都中央区晴海1-8-10 オフィスタワーX 21階
TEL.03-6221-3802 FAX.03-6221-3899
www.greencastonline.jp

取扱