

農林水産省登録
第21507号



芝生用殺菌剤

シバンバ®

フロアブル

®はシンジェンタ社の登録商標です。



帰って来たシバンバ!!



シバンバ®
フロアブル

syngenta®

TM



芝生用殺菌剤

シバンバ[®]
フロアブル

アゾキシストロビン・シプロコナゾール水和剤

◇ 農林水産省登録 第21507号

◇ 包装：500ml x 10本入

◇ 成分：アゾキシストロビン18.2%

シプロコナゾール7.3%

水、界面活性剤等74.5%

◇ 人畜毒性・毒物及び劇物取扱い：非該当

■ 特長

- ◇ 高い予防効果と治療効果を併せ持ち、特にラージパッチに対し優れた防除効果を発揮します。
- ◇ 残効性にも優れるため長期間にわたり病害を抑え、美しいターフを維持できます。

■ 適用病害と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アゾキシストロビンを含む農薬の総使用回数	シプロコナゾールを含む農薬の総使用回数
日本芝	葉腐病 (ラージパッチ)	666 ~ 1000倍	発病初期	4回以内	1㎡当り 200mL散布	8回以内	4回以内
	タラスポット病	1000倍					
	疑似葉腐病 (春はげ症)		休眠期前				

■ 効果・薬害等の注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 本剤は貯蔵中に分離することがあるので、使用に際しては容器をよく振ってください。
- 寒地型西洋芝のグリーンには薬害を生じる恐れがあるので、付近にある場合にはかからないように注意してください。
- りんごの一部品種（あかね、旭、ラリタン、きざし、シナノレッド、青りんご9号、わらび、ガラ、モーリーズデリシヤス、ウースター・ペアメイン、スパータン、コックスオレンジピピン、プラムレー、キッズオレンジレッド、ケント、レッドフリー、M.26、スペンサー、ビスタベラ、ナ-130等）では、葉にネクロシス（褐変）や落葉、また果実にはさび果や落果を伴う品種特有の激しい薬害が生じるので十分注意してください。また、周辺にこれら品種が栽培されている場合は、飛散（ドリフト）により薬害を生じる場合があるので、散布液がかからないよう十分注意してください。本剤を使用した散布器具及び希釈液タンクを用いて、りんごのこれら品種には散布しないでください。
- 隣接する他作物（あぶらな科、うり科、なす科、まめ科の作物）にかかると濃緑化、縮葉化や褐点等の薬害を生じることがあるので、散布液がかからないように十分注意してください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- 耐性菌の出現を防ぐため、過度の連用を避け、なるべく作用性の異なる薬剤と組み合わせて輪番で使用してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

■ 安全使用上の注意

- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 誤飲などのないよう注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
- 公園等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。

- 使用前にラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

- 直射日光を避け、食品と区別して、なるべく低温な場所に密栓して保管してください。
- 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。
- また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

販売

シンジェンタ ジャパン株式会社

ローン アンド ガーデン事業本部

〒104-6021 東京都中央区晴海1-8-10 オフィスタワーX21階

TEL:03-6221-3802 FAX:03-6221-3899

http://www.syngenta.co.jp/golf

取扱い