



大地いっぱいの、ありがとう。

スミチオン剤は皆様のご愛顧で
50年以上の歴史を重ねました。

芝の害虫に



コガネムシ類



シバツトガ



シバオサゾウムシ



スジキリヨトウ

緑化のスタンダード



アメリカシロヒトリ



カメムシ類



ゲンバユスデガ



フラーバラノウムシ

樹木類の害虫に

緑化用 スミチオン[®] 乳剤

®は住友化学(株)の登録商標



住化グリーン株式会社

緑化用

スミチオン® 乳剤

農林水産省登録第21704号

有効成分：MEP……50.0%

人畜毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)

LD₅₀ ラット♂ 1,900mg/kg, ♀ 2,250mg/kg

魚毒性：コイ 96h 4.0mg/l

有効年限：4年

PRTR：MEP(PRTR・1種 251)、キシレン(PRTR・1種 80)



特長

各種害虫への幅広い殺虫スペクトラムと接触・食毒効果
植物に対して浸透性を有し、安定した殺虫効果
温血動物に対する影響が少なく、安全性が高い
環境に対してインパクトが少ない

適用害虫名および使用方法

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用 液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	MEPを含む農薬の 総使用回数							
芝	コガネムシ類幼虫	1000倍	—	発生初期	6回以内	1㎡当り3ℓ散布	6回以内							
	シバツトガ スジキリヨトウ			1㎡当り0.3～2ℓ散布										
	シバオサゾウムシ			幼虫発生期		1㎡当り3ℓ散布								
つつじ類	ハマキムシ類 グンバイムシ類	500～1000倍		—		6回以内		散布	6回以内					
樹木類	アブラムシ類 グンバイムシ類 フラーバラゾウムシ													
	アメリカシロヒトリ	500～1000倍												
せんりょう	アザミウマ類 カメムシ類	1000倍								—	6回以内	散布	6回以内	
こでまり	カイガラムシ類													
にしきぎ	ケムシ類													
しゃりんばい だいおうしょう	シンクイムシ類													
さかき	ハマキムシ類													
さんごじゅ	ワタノメイガ													
きく	フラーバラゾウムシ カメムシ類 ヨトウムシ類													1000～2000倍
	アブラムシ類													
ばら	フラーバラゾウムシ													1000倍

⚠ 効果・薬害等の注意

- ボルドー液と混用する場合は散布直前に行ない、できるだけ早く使用してください。ただし、その他のアルカリ性の強い農薬との混用はさけてください。
- DCPA剤との同時施用及び10日以内の近接散布は薬害を生ずるおそれがあるのでさけてください。
- 本剤は自動車、壁などの塗装面、大理石、御影石に散布液がかかると変色するおそれがあるので、散布液がかからないよう注意してください。
- あぶらな科作物には、薬害を生ずるおそれがあるので付近にある場合にはかからないよう注意して散布してください。
- ひのきに対しては個体によって落葉、枯損に至るおそれがあるので、付近にある場合にはかからないよう注意してください。
- 芝のコガネムシ類幼虫に使用する場合は、散布液が土壤中に十分しみ込むよう、ジョロ等で1㎡当り3ℓを散布してください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- ミツバチに対して影響があるので以下のことに注意してください。
①ミツバチの巣箱およびその周辺に近づかないようにしてください。
②養蜂が行なわれている地区では周辺への飛散に注意する等、ミツバチの危害防止に努めてください。
- フラーパーゾウムシに使用する場合は、植物防疫(事務)所、病虫害防除所等関係機関の指導をもとに実施してください。

⚠ 安全使用上の注意

- 誤飲などのないように注意してください。
- 本剤の解毒剤としては硫酸アトロピン製剤及びPAM製剤が有効であると報告されています。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 本剤は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合は直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 散布の際は農薬用マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗顔・うがいをするともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 街路、公園等で使用する場合は、散布中および散布後(少なくとも散布当日)に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
- 水産動植物(魚類、甲殻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調整を行ない、使いきってください。散布器具および容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

● 使用前にはラベルをよく読んでください。● ラベルの記載以外には使用しないでください。● 小児の手の届く所には置かないでください。● 使用後の空容器等は圃場などに放置せず、適切に処理してください。

SCC GROUP
住友化学アグリグループ



住化グリーン株式会社

〒104-0032 東京都中央区八丁堀4丁目5番4号
TEL.(03)3523-8282 FAX.(03)3523-8071
http://www.sumika-green.jp