


ダブル展着効果で パワー除草!

1
サッと広がり、



2
スッと染み込み、



3
根まで枯らす!



スギナ、チガヤ、ササなどの難防除雑草も
素早く! 2ヵ月! 根まで枯らす!

非選択性茎葉処理除草剤



 タッチダウンiQ®


syngenta.

シンジェンタ ジャパン株式会社

農薬をご使用の際は、ご購入先、または当社ウェブサイトなどで最新の登録内容をご確認ください。

®はシンジェンタ社の登録商標

- ダブル展着効果で、サツと広がり、スツと染み込み、素早く！2ヵ月！根まで枯らす。
- 高濃度の活性成分で、スギナなどの難防除雑草にも優れた効果。
- 散布1時間後の雨でも効果を発揮。
- 土壌に落ちると速やかに分解。



農林水産省登録：第22161号 有効成分：グリホサートカリウム塩…44.7% 毒物及び劇物取締法：非該当

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを 含む農薬の 併用回数
				量 (ml/10a)	希釈水量 (ℓ/10a)			
陸稲			耕起前又はは種前 (雑草生育期: 草丈30cm以下)			2回以内		2回以内
水田作物 (水稲を除く) 移植水稲	—	一年生雑草	耕起前 (雑草生育期: 草丈30cm以下)	250~500	25~100	1回		2回以内
直播水稲			は種14日前~ 出芽前(雑草生育期) (乾田不耕起栽培)		50~100			
水田作物 (水田刈跡)	水田刈跡	多年生雑草 オモダカ クロクワイ キョウシュメ/ヒエ	水田作物刈取後 (雑草生育期)	500~1000	25~100			1回
水田作物 (水田畦畔)	水田畦畔	一年生雑草 多年生雑草 スギナ	収穫14日前まで (雑草生育期: 草丈30cm以下)	250~500 500~1000 1500~2000	50~100			3回以内
水田作物、畑作物 (休耕田)	休耕田	多年生雑草	雑草生育期 (草丈50cm以下)	250~500 500~1000		2回以内		
さとうきび	—	一年生雑草	耕起前又はは種前 (雑草生育期: 草丈30cm以下)	250~500	25~100	1回		6回以内
	圃場内の 周縁部	多年生雑草	雑草生育期 但し、収穫7日前まで	250~500 500~1000	25~50	2回以内		
麦類 (大麦、小麦(秋播) を除く)	—		耕起又はは種前 (雑草生育期)		25~100			
	圃場内の 周縁部		雑草生育期 但し、収穫7日前まで (草丈30cm以下)		25~50	3回以内		
大麦	—	一年生雑草	耕起又はは種前 (雑草生育期)		25~100	1回		
	圃場内の 周縁部		は種後出芽前 雑草生育期 (草丈30cm以下)	250~500				3回以内
			雑草生育期 但し、収穫7日前まで (草丈30cm以下)		25~50	3回以内		
小麦 (秋播)	—		耕起又はは種前 (雑草生育期)		25~100			
			は種後出芽前 雑草生育期: 草丈30cm以下)		25~100	1回		
	圃場内の 周縁部	多年生 イネ科雑草	耕起3日以前 (雑草生育期)	500~1000				
雑穀類 (そばを除く)	—	一年生雑草	雑草生育期 但し、収穫3日前まで (草丈30cm以下)		25~50			
			耕起又はは種7日以前 (雑草生育期: 草丈30cm以下)	250~500		2回以内		2回以内
そば		一年生及び 多年生雑草 (スギナを除く)	耕起又はは種前 (雑草生育期: 草丈30cm以下)		25~100		雑草 基葉散布	
果樹類 (かんきつを除く)		一年生雑草	収穫5日前まで (雑草生育期: 草丈30cm以下)	500~1000				3回以内
		スギナ	収穫5日前まで (雑草生育期)	1500~2000	25~50	3回以内		
かんきつ		一年生雑草	収穫5日前まで (雑草生育期: 草丈30cm以下)	250~500	10~100			5回以内
		多年生雑草	収穫5日前まで (雑草生育期)	500~1000				
野菜類 (えだまめ、たらのぎ、 はくさい、キャベツ、レタス、 なます、たまねぎ、ほうれんそう、 にんじん、ごぼう、 はつかい、だいこん、アスパラガス、 トマト、きゅうり、なす、 オリーブ(園)、しゃも(畑/園用)、 びわ(園)、黒豆、ピーマン、 ひよこ(園)、黒豆(にんじんを除く)			耕起7日以前 (雑草生育期: 草丈30cm以下)		25~50	1回		1回
レタス						2回以内		
ねぎ	—		耕起又は定植7日以前 (雑草生育期: 草丈30cm以下)			3回以内		3回以内
			畦間処理:雑草生育期 (草丈30cm以下) 但し、収穫7日前まで		25~100			
キャベツ はくさい			耕起又は定植7日以前 (雑草生育期: 草丈30cm以下)			1回		1回
にんじん	一年生雑草		耕起又はは種7日以前 (雑草生育期: 草丈30cm以下)	250~500		2回以内		2回以内
ほうれんそう						1回		3回以内
だいこん						1回		2回以内
はつかいだいこん						1回		1回
えだまめ たらのぎ			耕起7日以前 (雑草生育期: 草丈30cm以下)		25~50			
たまねぎ			畦間処理:雑草生育期 (草丈30cm以下) 但し、収穫7日前まで			3回以内		
トマト きゅうり なす			耕起7日以前 (雑草生育期: 草丈30cm以下)			1回		
			畦間処理:雑草生育期 (草丈30cm以下) 但し、収穫前日まで		25~100			3回以内
アスパラガス		一年生広葉雑草	萌芽前または 収穫打切り後 (雑草生育期: 草丈30cm以下)	500~1000 1000	25~100	3回以内		
		スギナ	畦間処理: 雑草生育期 但し、収穫前日まで	1500~2000	25~50			

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の使用回数	
				重量 (㎖/10a)	希釈水量 (ℓ/10a)				
豆類 (種実、たさいす、 らっかせいを除く)	—	一年生雑草	耕起7日以前 (雑草生育期: 草丈30cm以下)	250~500	25~50	1回	雑草 茎葉散布	2回以内	
			時間処理: 雑草生育期 但し、収穫3日前まで					25~100	
だいず		コウキヤガラ	は種後出芽前 (雑草生育期: 草丈30cm以下)		25~50	2回以内		4回以内	
			時間処理: 雑草生育期 但し、収穫前日まで		25~50				
いも類(ばれいしょ、 かんしょを除く)		—	一年生雑草		耕起又はは種7日以前 (雑草生育期: 草丈30cm以下)	25~100			1回
					は種後出芽前 (雑草生育期: 草丈30cm以下)	25~50			2回以内
かんしょ		—	一年生雑草		は種後出芽前 (雑草生育期: 草丈30cm以下)	25~50			1回
					種付後萌芽前 (雑草生育期: 草丈30cm以下)	25~100			
とうがらし類		一年生雑草	—		耕起7日以前 (雑草生育期: 草丈30cm以下)	25~50		1回	2回以内
ピーマン									
オリーブ(葉)	3回以内								
びわ(葉)	10回以内 (1年間に2回以内)								
薬用になじん									
しゃやく (薬用)	一年生及び 多年生雑草	時間処理: 雑草生育期 但し、収穫7日前まで	25~100	3回以内		3回以内			
茶						播種7日前まで (雑草生育期:春~夏期): 草丈30cm以下)	2回以内	2回以内	
桑						雑草生育期 (草丈30cm以下)	4回以内	4回以内	
飼料用 とうもろこし	一年生雑草	—	は種後出芽前 雑草生育期 (草丈30cm以下)	200~500	25~100	2回以内	2回以内		
ソルガム			耕起又はは種前 (雑草生育期: 草丈30cm以下)	250~500	25~50				
林木	造林地 (地ごしらえ)	ススキ、ササ類、 クサ等の多年生雑草 落葉雑草かん木	生育盛期以降 (夏~秋期)	1000~1500	30	3回以内	雑草 木茎葉散布	3回以内	
牧草	牧野・草地 (更新)	一年生雑草	耕起10日以前 (雑草生育期)	300~500	25~100	2回以内	雑草 茎葉散布	3回以内	
		多年生雑草	は種10日前~ は種当日 (耕起前地処理: 雑草発生抑制)	200~500					
樹木類	—	リードカナリ グラス	最終刈取後 (雑草生育期: 草丈50cm以下)	500~1000	50	4回以内		4回以内	
		一年生雑草	雑草生育期 (草丈30cm以下)	250~500	25~50	4回以内			
樹木等	公園 園地 とう 駐車場 道路 鉄道 運動場 宅地 の1面等	多年生雑草	雑草生育期 (草丈50cm以下)	500~1000	10~100	3回以内	植栽地を 除く 樹木等の 周辺地に 雑草茎葉 散布	3回以内	
		スギナ	雑草生育期 (草丈50cm程度)	1500~2000	25~100				
		ヒレハリソウ	雑草生育期 (草丈100cm程度)						
		ススキ、クサ	雑草生育期 (草丈100cm程度)						
		ササ類	雑草生育期 (草丈50cm以下)	1000~2000	50~100				
		マツヨシザサ類	雑草生育期 (夏~秋期) 草丈50cm以下)						
		雑草かん木	雑草生育期 (150cm)以下		25~100				

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	希釈倍數	使用液量	本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数
たいいず	—	一年生 広葉雑草	生育期 (萌芽生長期) 但し、収穫 7日前まで	2倍	0.1mlを1〜3か所/株 (500ml/10a)	2回以内	雑草 茎葉塗布	4回以内
樹木等	公園 庭園 畑とう 駐車場 道路 敷道 運動場 宅地 のり面 等	雑草生育期	雑草生育期	原液	5〜15ml/本	—	竹稈 注入処理	—
		雑かん木	伐採直後	原液又は 2倍希釈液	切り口全体に 十分量を塗布		積敷地を 除く樹木の 周辺地に 切株 塗布処理	
林木 畑作物	林地 放置林地 畑地	竹類	夏〜秋期	原液	5〜15ml/本	—	竹稈 注入処理	—
		クス、フジ等の つる類	春〜秋期	原液又は 2倍希釈液	処理部のつる/注入量 〜2.0cm/0.5ml 2.1〜3.0cm/1.0ml 3.1〜4.0cm/1.5ml 4.1〜5.0cm/2.0ml 5.1cm以上はつる径が 1.0cm増えることに 0.5mlずつ増量する		つる 注入処理	

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。●使用後の空容器は園場などに放置せず適切に処理してください。

シンジェンタ ジャパン株式会社
〒104-6021 東京都中央区晴海1-8-10 オフィスタワーX21階
[ウェブサイト] <http://www.syngenta.co.jp>

