




芝用殺菌剤

ターフトップ®DF

包装単位：500g×10袋

成分・性状

商品名：ターフトップDF
種類名：クレソキシムメチル水和剤
有効成分：クレソキシムメチル……40.0%
構造式：CH₃



性状：淡褐色水和性細粒

安全性

- 人畜毒性：普通物
急性経口毒性：
ラット（♂・♀）LD₅₀ 5,000mg/kg以上
急性経皮毒性：
ラット（♂・♀）LD₅₀ 2,000mg/kg以上
- 魚毒性：B類相当
コイ（原体）TLm（48hr）：0.54ppm

■適用病害と使用方法

*印は本剤およびクレソキシムメチルを含む農薬の総使用回数の制限を示します。

作物名		適用病害名	希釈倍数 (倍)	使用時期	使用方法 (散布)	総使用回数*		
						本剤	クレソキシム メチル	
芝	ベント グラス	炭疽病	1,000	発病初期	200～500 <i>ml</i> /m ²	3回以内	3回以内	
		立枯病(ティクオールパッチ) ピシウム病			500 <i>ml</i> /m ²			
		葉腐病(ブラウンパッチ)			0.2～1 ℓ /m ²			
		疑似葉腐病(イエローパッチ)		秋～春期 根雪前	500 <i>ml</i> /m ²			
		雪腐小粒菌核病						
	ヘルミントスポリウム葉枯病 カーブラリア葉枯病 フェアリーリング病	発病初期						
	葉腐病(ラージパッチ)							
	疑似葉腐病(像の足跡)			休眠期前				
	疑似葉腐病(春はげ症)	発病初期						200～250 <i>ml</i> /m ²
	さび病							

(2008年3月現在の登録内容)

⚠ 効果・薬害等の注意

- 散布液調製の際は、水をかきまぜながら本剤の所定量を徐々に加えてください。
- 薬剤耐性菌の出現を防ぐため、本剤の過度の連用はさけ、なるべく作用性の異なる薬剤との輪番で使用してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量・使用時期・使用方法を誤らないよう注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所など関係機関の指導を受けるようにしてください。

⚠ 安全使用上の注意

- 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので、眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 本剤は水産動物に影響を及ぼすので、養殖池等周辺での使用には十分注意してください。
- 密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、小児の手の届かない冷涼・乾燥した所に保管してください。

本剤を使用するときは

- 使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

販売元 株式会社 ニッソーグリーン
http://www.ns-green.com/

東京都台東区上野3-1-2 (秋葉原新高第一生命ビル5F)
〒110-0005 ☎03-5816-4351

製造元 日本曹達株式会社
本社 〒100-8165 東京都千代田区大手町2-2-1

ターフトップ®DF

ターフトップは、日本名「マツカサシメジ」と呼ばれるきのこ由来のクレソキシムメチルを有効成分とした殺菌剤です。

幅広い抗菌スペクトラムと優れた予防効果で、グリーンをしっかりとガードします。

ドライフロアブル（顆粒水和剤）の使いやすい製剤です。



天然物由来の
ストロビリリン系殺菌剤。

芝用殺菌剤

ターフトップ®DF

●クレソキシムメチル……40.0%

