


緑地管理用除草剤

ダブルイソパクト

【グリホサートイソプロピルアミン塩・MCPAイソプロピルアミン塩液剤】

空き地や駐車場の
頑固な雑草に確かなききめ!!
効力の長さも魅力です



スギナ・ツユクサに効果的!

▲無処理区



◀処理区

株式会社 ユニカス

[5月17日散布処理後19日目]

多年生雑草に効果の高い
グリホサートと
スギナ等の広葉雑草に
効果の高いMCPAのダブル効果で
問題雑草を長期に抑制します

ダブルインパクト

空き地・
駐車場等の管理に
効果的!



●適用雑草と使用方法

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	10アールあたりの使用量		本剤の使用回数	使用方法	グリホサートを含む農薬の総使用回数	MCPAを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量				
樹木等	公園、庭園、堤とう、駐車場、道路、運動場、宅地、のり面、鉄道等	一年生及び多年生雑草	雑草生育期	1,000-2,000ml	100ℓ	3回以内	植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布	3回以内	3回以内

▲効果・薬害等の注意

- 本剤はグリホサート及びMCPAを含む農薬であるので、他のグリホサート及びMCPAを含む農薬の使用回数と合わせ、総使用回数の範囲内で使用してください。
- 本剤の所定量を所定量の水でうすめよくかき混ぜてから散布してください。泥などで濁った水は効果を低下させるので使用しないでください。
- 使用に際しては、展着剤加用の必要はありません。
- 本剤は土壌中で速やかに不活性化するので、雑草発生前処理では効果がないので注意してください。
- 本剤は雑草茎葉部から吸収され、植物体内を移行し、特に地下部に移行して植物全体を枯殺するため、散布前に雑草の地上部を刈り払わないでください。
- 散布後6時間以内の降雨は効果を低下させることがあるので、天候を良く見極めてから散布してください。
- 散布薬剤の飛散あるいは本剤の流出によって、樹木等の有用植物に薬害が生じることのないよう十分に注意して散布してください。
- 水源池、養殖池などに本剤が飛散、流入しないよう十分に注意してください。
- 本剤の調製、散布及び保管に際しては、合成樹脂の内層のない鋼鉄製(ステンレスを除く)の容器類は使用しないでください。
- 本剤の散布に用いた器具類は、使用後できるだけ早く水で十分洗っておき、他の用途に使用する場合に薬害の原因にならぬよう注意してください。
- 散布液剤の飛散によって自動車やカラートタンの塗装などへ影響を与えないよう散布区域内の諸物件に十分留意してください。

●散布器具、容器の洗浄水は河川等に流さず、空容器等は、環境に影響を与えないよう適切に処理してください。

●本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

▲安全使用上の注意

- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 本剤は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合は直ちに石けんでよく洗い落してください。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗眼してください。
- 公園、堤とう等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないように縄張いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないように注意を払ってください。
- 使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管してください。

保管

- 密栓し、直射日光を避け、食品と区別して、冷涼な所。

■普通物／A類相当 ■規格／500ml×20

使用量に合わせ薬液を調製し、使い切ってください。空ビンは圃場などに放置せず、3回以上水洗し、適切に処理してください。洗浄水はタンクに入れてください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●本剤は小児の手の届くところには置かないでください。

■お求めは…	■販売
	<p>株式会社 ユニカス</p> <p>■本社／〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-5-2 ☎03-5296-2340 http://www.mbc-g.co.jp</p> <p>■札幌／☎011-222-2305 ■仙台／☎022-261-1319 ■名古屋／☎052-951-7235 ■大阪／☎06-6371-3126 ■福岡／☎092-712-8330</p>