

農業用殺虫剤

トレボン[®]乳剤


有効成分:エトフェンプロックス[PFRTR-1種64]…20.0%

殺虫剤分類 3A



農林水産省「稻発酵粗飼料
生産・給与技術マニュアル」
に掲載された農薬です。

ラベルの
記載以外には
使用しないで
ください。

トマト
コナジラミ類稲
コブノメイガ、ツマグロコバイ
ウンカ類、イネドロオイムシ、
イナゴ類
カメムシ類
イネミズウムシすいか
アブラムシ類
コナジラミ類
ハスモンヨトウ
ヨトウムシオクラ
アブラムシ類
カメムシ類ふき
コナジラミ類
フキノメイガ
ヨトウムシさやいんげん
ワタアブラムシ
ウラナミシジミ
マメノメイガさといも
ハスモンヨトウ
葉しょうがモロヘイヤ
アザミ
ウマ類せり
うど
アブラムシ類かんしょ
ナカジロシタバ
ア布拉ムシ類
ハスモンヨトウやまのいも
やまのいも(むかご)
ア布拉ムシ類
ヤマノイモガ
ハスモンヨトウみずいも
オキナワイナゴモドキかぼちゃ
コナジラミ類
ウリハムシチャノホソガ、
チャノミドリヒメコバイ
チャノキイロアザミウマ

樹木類

にがうり
ア布拉ムシ類、ウリノメイガ
カメムシ類、コナジラミ類
ヨトウムシ類ピーマン
コナジラミ類
アブラムシ類ばれいしょ
アブラムシ類レタス
アブラムシ類なす
コナジラミ類
アブラムシ類えだまめ
マメシングイガ
シロイチモジマダラメイガ
ダイズサヤタマバエ、カメムシ類
フタスジヒメハムシ
ウコンノメイガ
ツメクサガ
ハスモンヨトウキャベツ
アオムシ、
コナガ、
ヨトウムシ、
ア布拉ムシ類はくさい
アオムシ、
コナガ、
ヨトウムシ、
ア布拉ムシ類メロン
ア布拉ムシ類
コナジラミ類ねぎ
シロイチモジヨトウゆり
アブラムシ類カーネーション
アブラムシ類麦類
ヒメトビウンカ
ア布拉ムシ類

栽培する作物、
発生する害虫に
合わせてご使用
ください。

キャベツ



はくさい



だいこん

かんきつ

コアオハナムグリ
ケシキスイ類
ミカンハモグリガ
チャノキロアザミウマ

とうもろこし



Très bon
とても 良い

名は剤を表す

トレボンの語源はフランス語の「Très bon」です。

適用
拡大おうぎ:ウリハムシモドキ
じゅんさい:マダラミズメイガ、ジュンサイハムシに適用拡大

●適用害虫名と使用方法

(令和6年4月24日付拡大登録内容含む)

| 作物名・ 適用場所 | 適用害虫名 | 希釈倍数(倍) | 10a当たり 使用液量 | 使用時期 | 使用 回数※1 | 使用 方法 | 作物名・ 適用場所 | 適用害虫名 | 希釈倍数(倍) | 10a当たり 使用液量 | 使用時期 | 使用 回数※1 | 使用 方法 |
|-------------------|---|-----------|----------------|------------------|------------|----------|---------------------------|---|---------|----------------|------------------|------------|----------|
| 稻 | コブノメイガ | 1000 | 60~150ℓ | 収穫14日前まで 3回以内 | 25ℓ | | 豆類 (穂実、ただし、だいす、あずきを除く) | マメシングイガ、アブラムシ類、シロイチモジマダライガ、ダイズサヤダマバエ、カズミシ類、タヌシヒメハムシ、ハスモンヨトウ、ウラナミシジミ、アズキノメイガ | 1000 | 100~300ℓ | 収穫14日前まで 2回以内 | | |
| | ツマグロヨコバイ、ウンカ類、イネドロイムシ、イナゴ類 | 1000~2000 | | | | | | | | | | | |
| | カメムシ類、イネミズゾムシ | 2000 | | | | | | | | | | | |
| | ウンカ類 | 300~600 | | | | | | | | | | | |
| | ツマグロヨコバイ、イネミズゾムシ、イネドロイムシ | 300 | | | | | | | | | | | |
| | カメムシ類 | 600 | | | | | | | | | | | |
| きび | アカスジカスミカメ | 1000 | 1000 | 100~300ℓ | 散布 | | だいす | マメシングイガ、ア布拉ムシ類、シロイチモジマダライガ、ダイズサヤダマバエ、カズミシ類、タヌシヒメハムシ、ハスモンヨトウ、ウラナミシジミ、アズキノメイガ、ウコンノメイガ | 2000 | 200~400ℓ | 摘採21日前まで 3回以内 | | |
| あわ | アワノメイガ アワヨコウ | 1000 | | | | | | | | | | | |
| キャベツ | アオムシ、コナガ、ヨトウムシ、アブラムシ類 | 1000~2000 | | | | | | | | | | | |
| はくさい | アオムシ | 1000~2000 | | | | | | | | | | | |
| だいこん | アオムシ | 1000~2000 | | | | | | | | | | | |
| ブロッコリー | アオムシ | 1000~2000 | | | | | | | | | | | |
| ねぎ | シロイチモジヨトウ | 2回以内 | | | | | | | | | | | |
| レタス | アブラムシ類 | 3回以内 | | | | | | | | | | | |
| すいか | アブラムシ類、コナジラミ類、ハスマントウ、ヨトウムシ | 4回以内 | | | | | | | | | | | |
| メロン | アブラムシ類、コナジラミ類 | 1000~2000 | | | | | | | | | | | |
| なす | アブラムシ類 | 1000~2000 | | | | | | | | | | | |
| ビーマン | アブラムシ類、カズミシ類 | 1000~2000 | | | | | | | | | | | |
| オクラ | アブラムシ類、アブラムシ類 | 1000~2000 | | | | | | | | | | | |
| きゅうり | コナジラミ類、アブラムシ類 | 1000~2000 | | | | | | | | | | | |
| にがうり | アブラムシ類、ウリノメイガ、カズミシ類、コナジラミ類、ヨトウムシ | 100~300ℓ | | | | | | | | | | | |
| トマト | コナジラミ類 | 1000~2000 | | | | | | | | | | | |
| さやえんどう | シロイチモジヨトウ、ヨトウムシ、ウラナミシジミ | 2回以内 | | | | | | | | | | | |
| 実えんどう | ワタアブラムシ、ウラナミシジミ | 2回以内 | | | | | | | | | | | |
| さやいんげん | マメノメイガ | 2回以内 | | | | | | | | | | | |
| えだまめ | マメンケイガ、シロイチモジマダライガ、ダイズサヤダマバエ、カズミシ類、タヌシヒメハムシ、ウコンノメイガ、ツメカサガ | 1000~2000 | | | | | | | | | | | |
| 未成熟ささげ | ハスモンヨトウ | 1000~2000 | | | | | | | | | | | |
| うど | アブラムシ類 | 1000 | | | | | | | | | | | |
| モロヘイヤ | アザミウマ類 | 1000 | | | | | | | | | | | |
| かんきつ | コアオハナムグリ、ケスキイシ類 ミカンハモグリガ | 200~700ℓ | | | | | | | | | | | |
| マンゴー | チャノキイロアザミウマ | 2000 | | | | | | | | | | | |
| 麦類 | ヒメトイウカ、アブラムシ類 | 1000 | | | | | | | | | | | |
| とうもろこし | アワノメイガ、アワトウ、ツマジロクサヨトウ | 60~150ℓ | | | | | | | | | | | |
| 飼料用 とうもろこし(子実) | アブラムシ類 | 1000~300ℓ | | | | | | | | | | | |
| ぱれいしょ | アブラムシ類 | 1000~300ℓ | | | | | | | | | | | |
| かんしょ | ナカジロシバ、アブラムシ類、ハスモンヨトウ | 100~300ℓ | | | | | | | | | | | |
| やまのいも | アブラムシ類、ヤマノイモガ、ハスモンヨトウ | 100~300ℓ | | | | | | | | | | | |
| さといも | ハスモンヨトウ | 100~300ℓ | | | | | | | | | | | |
| さといも(葉柄) | コナジラミ類、ウリハムシ | 100~300ℓ | | | | | | | | | | | |
| かぼちゃ | コナジラミ類、ウリハムシ | 100~300ℓ | | | | | | | | | | | |

※1 本剤の使用回数および、エトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数を示す。※2 ガラス室等の施設

※3 ヨシ、オギ、スキ、セイタカラダソウ等の多年生雑草が優占している休耕田

△ 使用上の注意事項

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 本剤を本田の水稻に対して希釈倍数300~600倍で散布する場合は、所定量を均一に散布できる乗用型の速度運動式地上液剤少量散布装置を使用してください。
- 本剤のかんきつ、茶での散布は、場合によりハダニ類がふえることがあるので注意してください。
- ネギのシロイチモジヨトウの防除に使用する場合は、食入前の若令幼虫期に散布してください。
- 水耕栽培に使用する場合、本剤を使用した施設からの薬液をかんかん水流、排水路、河川等には絶対に流さず、適切に処理してください。
- さくのアブラムシ類への使用にあたっては、一部地域のワタアブラムシでは効果が劣ることがあるので使用をさせてください。
- 採種用とうきに使用する場合は、根部及び葉を収穫せず、種子の収穫に限って使用してください。
- 蚊に対する長期懸念があるのでは、近くに桑園がある場合には絶対に桑葉にかからないようにして下さい。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことについて注意してください。
- ①ミツバチ等の巣箱及びその周辺に飛散するおそれがある場合には使用しないでください。
- ②関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。
- 水産動植物(甲殻類、冷水魚)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。養殖池等周辺での使用はさけてください。なお、比較的低濃度でも魚が平衡失調を起こすおそれがあるので、十分注意してください。
- 敷設後は水管に注意してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 飲食などのないよう注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐かせないで、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
- 本剤は眼に対して強い刺激性があるので、散布液調製時に保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないように注意してください。眼に入った場合には直ちに十分に水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 原液は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないように注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 使用の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン、長袖の作業衣などを着用してください。
- 作業後は手足、顔などを石けんによく洗い、洗眼・うがいをしてください。
- 街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に關係のない者が散布区域に立ち入らないよう繩囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
- 本剤は自動車等の塗装面に散布液がかかると変色するおそれがあるので、散布液がかかるないように注意してください。
- 本剤の使用に当っては使用量、使用時期、使用方法を誤らないよう注意してください。とくに適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。
- 危険物第四類第二石油類に属するので、火気には十分注意してください。保管:火気をさけ、直射日光が当らない低温な場所に密栓して保管してください。

万一、誤食・誤飲した場合には、速やかに医師の手当を受けてください。
皮膚などにかかった場合には、十分な水で洗い流してください。さらに、異常を感じた場合は、医師の手当を受けてください。

● 使用前にはラベルをよく読んでください。

● ラベルの記載以外には使用しないでください。

● 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

● 容器・空袋などは圃場などに放置せず、適切に処理してください。

● 防除日誌を記帳しましょう。

