

バシバッチ®水和剤

適用病害
ナビ

ブラウン

ダラー

炭疽

立枯

雪腐

犬の足

象の足

春はげ

ラージ

バシッと抑える力強さ!

ブラウンパッチ



炭疽病




ダラースポット病



犬の足跡



◆主な病害の発生消長と防除適期



株式会社 理研グリーン

®:登録商標

種 類 名: プロピコナゾール・メプロニル水和剤
 有 効 成 分: 1-[2-(2,4-ジクロロフェニル)-4-プロピル-1,3-ジオキソラン-2-イルメチル]-1H-1,2,4-トリアゾール4%
 3'-イソプロポキシ-2-メチルベンズアニリド 50%
 そ の 他 成 分: 鉱物質微粉、界面活性剤 等46%
 性 状: 類白色水和性粉末 45μm以下
 安全性(製剤): 人畜毒性 普通物
 : 魚毒性 B類相当

●適用病害と使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	プロピコナゾールを含む 農薬の総使用回数	メプロニルを含む 農薬の総使用回数
ベントグラス	葉腐病 (ブラウンパッチ)	500～1,000	発病初期	4回以内	1㎡当り 1ℓ 散布	6回以内	8回以内
	ダラスポット病						
	立枯病 (テイクオールパッチ)	500	根雪前				
	炭疽病						
	雪腐小粒菌核病						
日本芝	葉腐病 (ラージパッチ)	500～1,000	発病初期	4回以内	1㎡当り 1ℓ 散布	6回以内	8回以内
	ヘルミントスポリウム 葉枯病	500～1,500					
	疑似葉腐病 (象の足跡)	1,000					
	疑似葉腐病 (春はげ症)	500～1,000	休眠期前 及び萌芽前				

! 効果・薬害等の注意

- (1) ベントグラスに使用する場合、夏期高温時に連用散布すると軽微な葉茎の濃緑色化および褐変を生ずることがあるので注意すること。
- (2) 蚕に対して毒性があるので、桑にはかからないように注意して散布すること。
- (3) 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

! 安全使用上の注意

- (1) 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には直ちに水洗いし、眼科医の手当を受けること。
- (2) かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。

保 管: 直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管すること。
 魚毒性: 本剤は魚介類に影響を及ぼすが通常の使用方法では問題ない。

★使用前にラベルをよく読む。★ラベルの記載以外には使用しない。★小児の手の届くところに置かない。
 ●使用量に合わせ薬液を調製し、使い切る。空袋は圃場などに放置せず適切に処理すること。



〒110-0005 東京都台東区上野 2-12-20 NDKロータスビル3階
 TEL.03-3833-6321 FAX.03-3833-6325 <http://www.rikengreen.co.jp>

仙台支店 TEL 022-222-9599 FAX 022-267-6505 大阪支店 TEL 06-6871-1691 FAX 06-6871-1811
 東京支店 TEL 03-3835-8134 FAX 03-3833-6325 福岡営業所 TEL 092-752-8391 FAX 092-752-8392
 静岡支店 TEL 054-283-5555 FAX 054-284-1769 クリーンセンター TEL 0538-58-1282 FAX 0538-58-1714
 名古屋支店 TEL 052-262-2661 FAX 052-251-3495 福岡工場 TEL 0538-55-5103 FAX 0538-55-5104

理研グリーン・パートナーショップ