

芝用殺菌剤 **パッチコロン[®]**水和剤

パッチコロン[®]は登録商標です。

シメコナゾール20%

●有効成分 シメコナゾール20% ●包装規格 250g×20

カーブラリア葉枯病と立枯病に適用拡大
経済的で広範囲の病害に卓効!!

適用
拡大



●カーブラリア葉枯病 (写真提供: 一谷 多喜郎)



●ダラースポット病 (写真提供: 笹野 市蔵)




●炭そ病 (写真提供: 一谷 多喜郎)



(写真提供: 谷 利一)

●春はげ症 (写真提供: 一谷 多喜郎)

適用
拡大



●立枯病(ノイシアデクライン)
(写真提供: 一谷 多喜郎)



●ブラウンパッチ (写真提供: 笹野 市蔵)



●ラージパッチ (写真提供: 笹野 市蔵)



株式会社 **エムシー緑化**

適用病害の発生時期と散布適期

適用拡大 ↓: 散布適期

病名	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
ラージパッチ												
春はげ症												
カーブラリア葉枯病												
立枯病												
ブラウンパッチ												
ダラースポット												
炭そ病												

適用病害と使用方法

適用拡大 ※ が推奨希釈倍数

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シメコナゾールを含む農薬の総使用回数
芝 (日本芝)	葉腐病 (ラージパッチ)	4000倍	発病初期	8回以内	1m ² 当り0.5ℓ散布	8回以内
		2000倍			1m ² 当り0.25~0.5ℓ散布	
		800倍			1m ² 当り0.2ℓ散布	
	疑似葉腐病 (春はげ症)	2000倍	休眠期前		1m ² 当り0.25ℓ散布	
	カーブラリア葉枯病 立枯病 (ゾisiaデクライン)	800倍	発病初期		1m ² 当り0.2ℓ散布	
芝 (ベントグラス)	葉腐病(ブラウンパッチ) ダースポット病	2000倍		1m ² 当り0.25ℓ散布		
	炭そ病				1m ² 当り0.5ℓ散布	

2009年6月1日現在

上記適用以外には使用しないでください。


パッチコロ[®]水和剤の上手な使い方

実施例 1トンタンクの水にパッチコロ[®]水和剤 250g×5袋を投入

(投下薬量 0.25g/m²)

「葉腐病(ラージパッチ)」、「カーブラリア葉枯病」、「立枯病」発病初期に
0.25g/水200cc(1m²当り)、

「炭そ病」発病初期に
0.25g/水500cc(1m²当り)で使用してください。



安全性(製剤)

人畜毒性：普通物※

※「毒物および劇物取締法」(厚生労働省)に基づく、
特定毒物、毒物、劇物の指定を受けない物質を示す。

魚毒性

コ イ (半数致死濃度96時間) 29.8ppm
オオミジンコ (半数致死濃度48時間) 116ppm

注意事項

- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 散布の際は防護マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除等関係機関の指導を受けてください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。●容器・空袋などは圃場などに放置せず、適切に処理してください。●防除日誌を記載しましょう。

※本製品は芝用殺菌剤であり、製品ラベルの記載内容以外には使用しないでください。
※本印刷物は2009年6月1日現在の資料、情報、データ等に基づいて作成していますが、記載データ及び評価はあくまでも測定値の代表例であり、全ての事例に当てはまるものではありません。

販売元

取扱い



株式会社 エムシー緑化

〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-7-7
TEL 03-6842-8590 FAX 03-6842-8593

パッチコロ[®] 0907-G