

農林水産省登録
第20413号

コガネ、
シバオサの
切り札!



芝生用殺虫剤

ビートルコップ®

顆粒水和剤




syngenta®

® はシンジェンタ社の登録商標

- 包装単位：2.5kg (250g×10袋)
- 成分：チアメトキサム……………23.5%
鋳物質微粉、界面活性剤等…76.5%
- 人畜毒性：普通物

ビートルゴッツ

顆粒水和剤



特 長

- 芝への優れた浸透移行性及び食毒作用により、低水量散布が可能
- 長期残効型なので散布回数が減らせ、コース管理作業の効率がアップ
- 薬剤を取り込んだ幼虫は食害を停止するのでターフが早く回復
- 各種芝草(日本芝、洋芝)に高い安全性

適用内容

作物名	適用害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	チアメトキサム を含む農薬の 総使用回数
芝	コガネムシ類幼虫	4000	1~2 ℓ/㎡	発生初期	3回以内	散布	3回以内
		400	0.1 ℓ/㎡				
		800	0.2 ℓ/㎡				
	シバオサゾウムシ成虫	2000	0.5 ℓ/㎡				
	シバオサゾウムシ幼虫	4000	1 ℓ/㎡				
		400	0.1 ℓ/㎡				
		800	0.2 ℓ/㎡				
まつ (生立木)	マツノマダラカミキリ 成虫	500	3 ℓ/本	発生初期 及び 発生最盛期 直前			

効果・葉害 等の注意

- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態、散布器具及び散布方法に合わせて調節してください。
- 散布液は調製した日に使い切ってください。
- 桑に付着する恐れのある場所では使用をさけてください。
- ミツバチを放飼している地域では使用しないでください。
- マルハナバチを使用している地域では使用しないでください。
- 本剤の散布液を調製した容器ならびに散布器具は使用後十分に水で洗浄してください。また、洗浄した廃液ならびにやむを得ず使い残した散布液は、河川などに影響がないように適切に処理してください。
- 使用後の空袋は圃場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
- 本剤をマツノマダラカミキリ防除で用いる場合、次の注意事項を守ってください。
 - ・ 散布液量は、樹高10mのまつ1本当たり3ℓを標準とし、木の大きさにより適宜増減し、樹冠部を中心に全面に散布してください。
 - ・ 水源地、養殖池等に本剤が飛散、流入しないよう十分に注意してください。
 - ・ 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、林業関係機関、林業技術者などの指導を受けてください。

安全使用上 の注意

- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないように注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。使用後は洗眼してください。
- 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので、皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とししてください。
- かぶれやすい体質の人は、取扱いに十分に注意してください。
- 公園等で使用する場合には、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないように縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。（水産動植物に関する注意：通常の使用方法では該当しません）

- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
- 使用後の空容器は圃場などに放置せず適切に処理してください。

販売

シンジェンタ ジャパン株式会社

プロフェッショナル・プロダクツ部

〒104-6021 東京都中央区晴海1-8-10 オフィスタワーX 21階

(TEL) 03-6221-3802 (FAX) 03-6221-3899

http://www.syngenta.co.jp/golf

取扱い