

新規 ネオニコチノイド系殺虫剤

薬剤調製が簡単。

顆粒水和剤

農林水産省登録第20733号

フルスウィング®

芝草害虫

(コガネムシ類～鱗翅目害虫)を
ワイドに長～く防除します。

適用拡大
タマナヤガ幼虫

水量**500ml**から
使用できます。



スジキリヨトウ



シバオサゾウムシ



タマナヤガ幼虫



ドウガネブイブイ(幼虫)



ヒメコガネ



シバットガ

芝草用
殺虫剤



今までとは違う
新しい効きめ!!



広範囲の芝草害虫に長〜く効果が持続!!

フルスウィング® 顆粒水和剤

○有効成分……………クロチアニジン50.0%
○人畜毒性(豚体及び雛)……………普通物
○魚毒性(卵体)……………A 類

フルスウィングは住化武田農薬が研究・開発したネオニコチノイド系の新規化合物クロチアニジンを有効成分とする新しいタイプの芝草用殺虫剤です。本剤はコガネムシ類・シバオサゾウムシに優れた防除効果・残効性を示すのみならず、幅広い殺虫スペクトラムを持ち、鱗翅目害虫のシバツガ・スジキリヨトウに対しても優れた防除効果を発揮します。一方、人畜及び魚介類に対する影響は少ない薬剤です。

■特長

農林水産省登録 第20733号

① 幅広い殺虫スペクトラム

甲虫目、鱗翅目、半翅目、直翅目、アザミウマ目など幅広い害虫に殺虫活性を示すクロチアニジンを有効成分とした殺虫剤です。

② 優れた効果と残効性

コガネムシでは、成虫の発生期・産卵期・幼虫期のどの時期に散布しても優れた残効性を発揮します。

フルスウィングで殺虫効果が確認されている害虫

甲虫目	チビサクラコガネ	ヒラタアオコガネ
	セマダラコガネ	ウスチャコガネ
	アシナガコガネ	ヒメコガネ
鱗翅目	シバツガ	スジキリヨトウ

③ 優れた安全性

人畜及び魚介類に対する影響が少なく、日本芝、西洋芝ともに薬害の心配が少ない薬剤です。

④ 省力・経済的

コガネムシ類(甲虫目)とシバツガ(鱗翅目)との「同時防除」と「長い残効性」により、経済的防除が可能です。

■試験成績

コガネムシ類

(アシナガコガネ、ヒラタアオコガネ)


(社)日本植物防疫協会研究所(H12年)

発生：少発生

品種：コウライシバ

散布：7月6日

調査：7月28日(22日後)



シバツガ


静岡大学農学部(H11年)

発生：多発生

品種：ベントグラス

散布：7月17日

調査：7月31日(14日後)



■芝草に対する安全性

右記の芝品種に対しては2倍濃度(2500倍)でも薬害は認められませんでした。

年度	試験場所	芝草品種
平成12年	東日本グリーン研究所	ノシバ、コウライシバ、ベントクロスベントグラス
	兵庫県立中央農業技術センター	ティフトン、ノシバ、コウライシバ

■適用害虫と使用方法

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロチアニジンを含む農薬の総使用回数
芝	コガネムシ類幼虫	5000倍	発生初期	4回以内	1m ² 当たり 0.5L~1L散布	4回以内
	シバツガ スジキリヨトウ シバオサゾウムシ タマナヤガ幼虫				1m ² 当たり 0.5L散布	

■使用上の注意事項

- 蚕に対して影響があるので、桑に付着する恐れがある場所では使用しないでください。
- 本剤は目に対して刺激性があるので、目に入らないよう注意してください。目に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- ミツバチを放飼している地域では使用をさけてください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- マルハナバチに影響を及ぼす恐れがあるので注意してください。

■使用前にはラベルをよく読んでください。■ラベルの記載以外には使用しないでください。■小児の手に届くところには置かないでください。

SCC GROUP
住友化学グループ



株式会社日本グリーンアンドガーデン

〒104-0033 東京都中央区新川1丁目16番3号
TEL (03) 6222-5861 FAX (03) 3551-8400

取扱い