

作物名	みりなもかふきとなき						水稲(種子選別)
	かん	し	も	きう	りつ	マヤベ	
アーデント(水)	●	●	●	●	●	●	●
アクテリック(乳)	●	●	●	●	●	●	●
アクダラ(SG)	●	●	●	●	●	●	●
アグロシリシ(水)	●	●	●	●	●	●	●
アグロスリン(乳)	●	●	●	●	●	●	●
アタブロン(乳)	●	●	●	●	●	●	●
アタブロンSC(F/L)	●	●	●	●	●	●	●
アディオン(F/L)	●	●	●	●	●	●	●
アディオン(水)	●	●	●	●	●	●	●
アディオン(乳)	●	●	●	●	●	●	●
オトマイヤー(水)	●	●	●	●	●	●	●
ドマイヤー(WG)	●	●	●	●	●	●	●
ドマイヤー(F/L)	●	●	●	●	●	●	●
ニバーズ(乳)	●	●	●	●	●	●	●
ニバーズ(MC)	●	●	●	●	●	●	●
フロード(水)	●	●	●	●	●	●	●
フロード(F/L)	●	●	●	●	●	●	●
フロードエース(F/L)	●	●	●	●	●	●	●
ファーム(乳)	●	●	●	●	●	●	●
フルルメー(乳)	●	●	●	●	●	●	●
カCarol(乳)	●	●	●	●	●	●	●
ススマルク(DF)	●	●	●	●	●	●	●
ヒセクト(水)	●	●	●	●	●	●	●
エルサン(水)	●	●	●	●	●	●	●
エルサン(乳)	●	●	●	●	●	●	●
エルサン パバチオン(水)	●	●	●	●	●	●	●
エルサン パバチオン(乳)	●	●	●	●	●	●	●
エンセタン(乳)	●	●	●	●	●	●	●
オナタ(F/L)	●	●	●	●	●	●	●
リサダン(水)	●	●	●	●	●	●	●
リサダン(乳)	●	●	●	●	●	●	●
リフナック(F/L)	●	●	●	●	●	●	●
リマイト(水)	●	●	●	●	●	●	●
トリオン(水)	●	●	●	●	●	●	●
パルトラン(水)	●	●	●	●	●	●	●
フレート(液)	●	●	●	●	●	●	●
ロードジェット(水)	●	●	●	●	●	●	●
ローラ(乳)	●	●	●	●	●	●	●
ロスケード(乳)	●	●	●	●	●	●	●
ルホルス(乳)	●	●	●	●	●	●	●
ルビナス(水)	●	●	●	●	●	●	●
ロテツ(F/L)	●	●	●	●	●	●	●
ロマイド(乳)	●	●	●	●	●	●	●
ロマイド(水)	●	●	●	●	●	●	●
リアノックス(水)	●	●	●	●	●	●	●
リアノックス(乳)	●	●	●	●	●	●	●
ライハロン(水)	●	●	●	●	●	●	●
ライハロン(乳)	●	●	●	●	●	●	●
ランコンビ(F/L)	●	●	●	●	●	●	●
ランマイド(水)	●	●	●	●	●	●	●
ランマイド(乳)	●	●	●	●	●	●	●
レイエース(膏)	●	●	●	●	●	●	●
クモート(乳)	●	●	●	●	●	●	●
プロム(乳)	●	●	●	●	●	●	●
木虫霜(乳)	●	●	●	●	●	●	●
<和硫黄剤(F/L・ゾル)>	●	●	●	●	●	●	●
カウト(F/L)	●	●	●	●	●	●	●
カウト(乳)	●	●	●	●	●	●	●
スタークル(SG)	●	●	●	●	●	●	●
ターベリー(水)	●	●	●	●	●	●	●
ビンネース(WG)	●	●	●	●	●	●	●
ブラサイド(水)	●	●	●	●	●	●	●
ブラサイド(乳)	●	●	●	●	●	●	●
プラナック(水)	●	●	●	●	●	●	●
ミチオン(水)	●	●	●	●	●	●	●
ミチオン(乳)	●	●	●	●	●	●	●
ミナック(水)	●	●	●	●	●	●	●
ミロティー(乳)	●	●	●	●	●	●	●
製マシ油(乳)	●	●	●	●	●	●	●
成硫黄混合剤(液)	X	●	●	●	●		

薬 剤 名	作 物 名						水稲 (稲子・湯濁)
	み か ん	り ご し	な も ち	ぶ か ど う	き よ ま	な す や ば	
ダニカト(乳)	●						
ダントロン(F/L)				●	●		●
ダントゾ(膏)	●	●					
チェス(水)		●	●		●		
チーフメイト(乳)						●	
チュウリサイ(水)						●	
ディブテックス(乳・膏)						●	
ディブテックス(乳)						●	
デナロ・ミクロナボン(水)	●	●	●	●	●		
デミリン(水)							
テルスタ(FL)				●	●	●	
テルスター(水)				●	●	●	
トアローCT(水)		●					●
トクテオン(水)				●			
トクテオン(乳)						●	
トルネー(FL)					●	●	
トレボナ(水)		●	●	●			
トレボナ(乳)	×				△△△△	×	
トレボナ(EW)							
ニッソラン(乳)	●	●	●	●	●	●	
ノーモルト(水)		●	●	●	●	●	
バイスロイド(乳)		●	●	●	●	●	
バイスロイド(EW)	●	●	●	●	●	●	
ハクザップ(水)						●	
ハッサ(乳)						●	
ハシレックス(水)		●					
バーマチオン(水)			●	●	●		
バダナSG(膏)				●	●		
ハチハチ(FL)		●					
ハチハチ(乳)					●	●	
バノコン(乳)	●						
バリアード(WG)		●	●	●	●	●	
バロック(FL)		●	●	●	●	●	
ビニフェート(乳)							
ビルク(水)	●	●					
ピラニカ(EW)				●	●		
ピラニカ(水)	●	●	●	●	●		
ファルコン(FL)		●					
プリンス(FL)						●	
プレオ(FL)					●	●	
フローバック(DF)					●	●	
ベストガード(膏)				●	●	●	
ペイオフME(液)			●	●	●	●	
ベジホシ(乳)							
ホスクリン(水)						△	
ホスバー(乳)						●	
ボルスター(乳)			●		●	●	
ボルテージ(乳)						●	
マイトクリーン(FL)	●		●				
マイトコーネ(FL)	●	●					
マトリック(FL)		●					
マッツ(乳)		●	●		●	●	
マブリック(水)		●	●		●	●	
マブリック(EW)		●	●		●	●	
マブリックナック(水)		●	●		●	●	
マランソ(乳)	●				●		
マラハッサ(乳)					●	●	
ミカントップ(乳)	●						
ミクロナボン(水)						●	
ミルベノック(乳)						●	
メラード(水)						●	
モスピラン(膏)	●	●	●	●	●	●	
モレスタン(水)				●	●	●	
ラービン(水)			●				
ラービン(FL)						●	
ランネット45(DF)						●	
ランベック(乳)						●	
リンナクル(水)		●	●				
ルビックス(乳)	●	●	●			●	
レルタン(乳)							
ロディー(水)		●					
ロディー(乳)	●			●	●		
ロムダン(FL)		●					
DDVP50(乳)				●			
DDVP50・75(乳)		●	●		●	●	
EPN(乳)					●	●	
Mr.ジョーカー(水)					●	●	
ニース(農畜剤)	●	●					

作物名 薬剤名	み	な	か	き	な	き
	かん	しも	きう	り	ま	ヤベ
アリエッティ(水)					●	
アリエッティC(水)		●				
テリジマン(水)						
オーシャイン(水)	●	●	●	●		
オーツサイド(水)					●	
オキシボルドウ(水)					●	
カスミンボルドウ(水)						●
カーゼットFZ(水)					●	
カセット(水)						●
カンタス(DF)			●		●	
コサイドボルドー(水)					●	
サブロー(乳)				●	●	
サンヨール(乳)				●	●	
ジョーファイン(水)				●	●	
ジマンタイゼン(水)				●	●	
ジマンレックス(水)				●	●	
スイッチ(WG)			●			
スケーナ(水)						●
ストロビー(DF)		●				
ストロビー(FL)						
スミブレンド(水)				●		●
スミレックス(水)					●	●
セイビアー(FL)						●
石灰硫黄合剤(液)	×					
ダイゼド(水)				●	●	
ダイファアー(水)					●	
タイボルト・バランクス(FL)	●					
タコニール1000(FL)						
デラン(FL)			●			
デランC(水)					×	×
銅(塩基性塩化銅)(水)					●	
トリアシジン(水)				●		
トリフミン(水)				●		
トリフミン(乳)				●		
バイレトロンホ(水)				●		
バスワード(ViG)	●					
バリダシン(液)						●
ビスダイゼン(水)					●	
フェスティバルC(水)					●	
フェスティバルM(水)					●	
フロンサイド(水)					●	●
ブリザード(水)					●	
フルピカ(FL)	●					●
ベフトー(水)					●	
ベンコゼブ(水)					●	
ベンコゼブ(FL)					●	
ホライシン(DF)				●		
ポリオキシNAL(水・液)						
ポリオキシNAL(乳)					●	
ポリバリン(水)					●	
ポルドー(液)	×					
マネージ(水)		●		●		
モリスタン(水)				●		
有機銅(水)				●		
ランマン(FL)				●		
リドミルMZ(水)				●	●	
ルビゲン(水)				●	●	
ロブジマン(水)				●	●	
ロブラール(水)	●				●	●

●：混用して問題なかった。
△：物理性、効果低下などの点で問題がある。
▲：葉害の点で問題がある。
×：混用できない。

空欄：判定するに足りる知見や経験に乏しい。

- トレボン乳剤、ダイアジノン乳剤40とは混用しないでください。(凝固物生成)
- 本剤および同系統の薬剤は連続使用することにより一部の病害に耐性菌を生じ、効果の劣った事例がありますので、過度の連用は避けてください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。

なお、普及指導センター、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。

- 使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●小児の手の届く所には置かないでください。
- 空袋は園場等に放置せず適切に処理してください。

ベントール® 水和剤



- 幅広い適用をもった殺菌剤で、浸透性にすぐれ、予防と治療の2つの効果を示します。
- 茎葉の病害、貯蔵病害、種子伝染性病害、土壌病害など多方面にわたりすぐれた効果を示します。
- 低濃度で使えますから作物を汚染することが少なく、また経済的です。

適用病害と使用方法

有効成分：ペノミル〔メチルー1-（プチルカルバモイル）-2-ベンゾイミダゾールカーバメート〕・・・・・・50.0%

※印は、収穫物への残留回避のため、その日まで使用できる収穫（摘採）前の日数と、本剤及びその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

野菜類					
作物名	適用病害名	希釈倍数(倍)	使用時期※	総使用回数※	使用方法
きゅうり	菌核病・灰色かび病・炭そ病 黒星病・つる枯病	2000～3000	前日	本剤:3回 ペノミル:4回 (種子への処理1回、は種後は3回)	散布
	つる割病		定植前～定植1ヶ月後		1株当り150～300mℓ 灌水処理
うり類(漬物用)	炭そ病	1000	定植前～45日	本剤:2回 ペノミル:3回 (種子粉衣は1回、は種後は2回)	
トマト	萎凋病		定植前～定植1ヶ月後	本剤:3回 ペノミル:6回 (種子への処理1回、灌水は3回、散布は5回)	
	葉かび病・灰色かび病	2000～3000	前日	本剤:5回 ペノミル:6回 (種子への処理1回、灌水は3回、散布は5回)	
なす	菌核病	2000		定植後～14日	本剤:3回 ペノミル:4回 (種子粉衣は1回、は種後は3回)
	黒枯病・灰色かび病	2000～3000	1株当り400～600mℓ 土壌灌水		
	半身萎凋病	500 1000			
アスパラガス	茎枯病・株腐病	2000	3日	本剤:4回 ペノミル:5回 (種子粉衣は1回、は種後は4回)	散布
キャベツ	菌核病		7日	本剤:6回 ペノミル:7回 (種子粉衣は1回、は種後は6回)	
たまねぎ	灰色腐敗病	2000～3000	前日	本剤:2回 (本圃定植後は1回) ペノミル:3回 (種子粉衣は1回、は種後は2回 (本圃定植後は1回))	3分間苗根部浸漬
ねぎ	乾腐病	20	移植直前		5分間苗根部浸漬
	萎凋病	100～200 500	定植直前		30分間苗根部浸漬
	小園核菌敗病	100～200 500			5分間苗根部浸漬
		1000～2000	30日		30分間苗根部浸漬
らっきょう	乾腐病	500	移植直前		1回
しょうが	いもち病	1000	21日	2回	30分間種球浸漬
すいか	つる枯病・炭そ病・菌核病	2000～3000	前日	本剤:5回 ペノミル:6回 (種子粉衣は1回、は種後は5回)	散布
レタス	菌核病・灰色かび病・すそ枯病		14日	本剤:4回 ペノミル:5回 (種子粉衣は1回、は種後は4回)	
いちご	炭そ病	500	仮植前	本剤:3回 (本圃定植後は1回) ペノミル:4回 (種子粉衣は1回、は種後は3回 (本圃定植後は1回))	10～30分間苗根部浸漬
	仮植時又は本圃定植後 (但し収穫90日前まで)				1m ² 当り3ℓ 灌水
	仮植前				1～3時間苗根部浸漬
	仮植時及び仮植栽培期間				
パセリ	立枯病	1000	45日	本剤:2回 ペノミル:3回 (種子粉衣は1回、は種後は2回)	1m ² 当り3ℓ 灌水
わげき	萎凋病	500	移植前	1回	30分間種球浸漬
みょうが(花穂)	いもち病	2000	3日	3回	散布、但し花穂の発生期には マルチフィルム被覆により散布音が 直接花穂に分散しない状態で使用する
みょうが(茎葉)			みょうが(花穂)の収穫3日前 まで但し、花穂を収穫しない場 合にあっては開花期終了まで		散布
みつば	菌核病	種子重量の0.5% 500	は種前	1回	種子粉衣
ふき	葉枯病	2000	7日	2回	24時間種子浸漬
つるむらさき	紫斑病		14日		
べにばいんげん	菌核病		60日		
しそ(花穂)	菌核病		21日		
ビクヤ	炭腐症		14日	2回	
せんきゅう	黒色根腐病	160	移植前	1回	30分間種球浸漬
てんさい	褐斑病	2000～4000	21日	4回	散布
ばれいしょ	黒あざ病	種いも重の0.3～0.4%	移植前	1回	種いも粉衣
かんしょ	黒斑病	種いも重の0.4%			
	つる割病・黒斑病	500～1000			20～30分間苗基部浸漬
こんにゃく	乾腐病	50～100			種いもの芽基部に散布
豆類(種実) とうもろこし 野菜	フザリウム菌による病害	乾燥種子重量の0.16%	は種前	1回	種子処理機による種子粉衣
いんげんまめ	菌核病・角斑病	1000～1500	7日	本剤:4回 ペノミル:5回 (種子粉衣は1回、は種後は4回)	散布
えんどうまめ	褐斑病	1000～2000			
らっかせい	褐斑病	2000～3000			
だいず	そうか病	2000			
	紫斑病	1000～2000	14日		

ただいま登録作物
56

果樹類

作物名	適用病害名	希釈倍数(倍)	使用時期※	総使用回数※	使用方法
温州みかん	そうか病・灰色かび病	2000～3000	前日	4回	散布
	貯蔵病害(青かび病・緑かび病) 軸腐病・炭そ病・黒斑病	4000～6000			
かんきつ (温州みかんを除く)	そうか病・灰色かび病	2000～3000	7日	6回	
	貯蔵病害(青かび病・緑かび病) 軸腐病・炭そ病・黒斑病	4000～6000			
りんご	黒星病・黒点病・褐斑病・うどんこ病	2000～3000	7日	-	10～30分間根部浸漬
りんご(苗木)	白紋羽病	1000			
なし	輪紋病	2000	7日	本剤:6回 ペノミル:6回 (灌水は2回)	散布
	黒星病・うどんこ病	2000～3000			
	枝枯病・胴枯病	20			
かき	茎葉病・うどんこ病	2000～3000	7日	6回	
	炭そ病	2000			
ぶどう	褐斑病・うどんこ病	2000～3000	60日	本剤:3回 ペノミル:3回 (休眠期は1回)	散布
	灰色かび病・読腐病	2000			
	黒とう病・芽枯病	200～500			
	つる割病	500			
うめ	枝膨病	200	7日	1回	
	黒星病	3000			
びわ	灰斑病	2000～3000	14日	3回	
	ごま色斑点病	2000			
もも	灰星病・黒星病・ホモフシス菌敗病	2000～3000	3日	2回	
おうとう	灰星病	3000	14日		
くり	実炭そ病	2000～3000	裂果まで		
キウイフルーツ	果実軟腐症	2000	幼果期～果実肥大期 (6月～7月)	5回	

水稲

作物名	適用病害虫名	希釈倍数(倍)	使用時期※	総使用回数※	使用方法
水稲	ばか苗病・いもち病 イネシンガレセンチュウ	乾燥種初重の0.5～1.0%	は種前 (浸種前又は浸種後)	本剤:1回 ペノミル:2回 (種子への処理は1回)	種子粉衣
	ばか苗病	500～1000			6～24時間種子浸漬
	いもち病	30～50			12～24時間種子浸漬
	ばか苗病・いもち病 イネシンガレセンチュウ	30			10分間種子浸漬
水稲(箱育苗)	苗立枯病 (トリコデルマ菌)	500～1000	は種時1回または、は種時と は種7日後の2回	本剤:2回 ペノミル:2回 (種子への処理は1回)	育苗箱(30×60×3cm、 使用土壌約5ℓ)1箱当り 500mℓ 灌注する
	いもち病		は種時～は種7日後頃		

花き類

作物名	適用病害名	希釈倍数(倍)	使用時期※	総使用回数※	使用方法
ばきく	うどんこ病・黒星病	2000～3000	－	6回	散布
	白さび病	1000			
チューリップ	黒斑病・褐斑病	2000～3000	植付前または貯蔵前	2回	15～30分球根浸漬
	球根腐敗病	100～500			球根粉衣
		球根重量の0.1～0.2%			瞬間浸漬
シクラメン	萎凋病	20	植付前	3回	1鉢当り50～100ml 灌水
しゃくやく		500～1000	－		10分間苗基部浸漬
ぼたん	根異斑病	20	植付前		16時間苗基部浸漬
		500		2回	

ハウス

適用場所	作物名	適用病害名	10アール当り使用量	10アール当り散布液量	使用時期※	総使用回数※	使用方法
温室、ガラス室、ビニールハウス等の 密閉できる場所	きゅうり	灰色かび病	150g	5ℓ	前日	本剤:3回 ペノミル:4回 (種子への処理1回、は種後は3回) 本剤:5回 ペノミル:6回 (種子への処理1回、灌水は3回、散布は5回)	常溫煙霧
	トマト						

その他

作物名	適用病害名	希釈倍数(倍)	使用時期※	総使用回数※	使用方法
製菓用	雪腐病	2000～3000	根雪前	1回	散布
	炭そ病・白星病・輪斑病・褐色円星病		摘採 21日		苗木根部24時間浸漬
葉	白紋羽病	1000～2000	-	2回	1m ² 当り1～3ℓ 散布
	断折病	1000	は種及び移植後 仮植又は移植1～3日前まで		1m ² 当り2～3ℓ 散布
たばこ(苗木)	黒根病		発病初期	6回	1m ² 当り2ℓ 散布
芝(ペントグラス)	葉腐病(ブラウンパッチ)	2000～3000			
桑	胴枯病	1000	摘採 9日	2回	散布
	輪斑病	2000			