

対象作物 ▶ 日本芝、バミューダグラス、
ブルーグラス、ペントグラス
適用病害 ▶ さび病、ダラースポット病
ヘルミントスポリウム葉枯病
カーブラリア葉枯病

ラリーTM 水和剤



適用拡大NEWS

4分の1の水量 → 省力化
4分の1の薬量 → 低コスト

カーブラリア葉枯病(日本芝)とダラースポット病(ペントグラス)の防除に少量散布が追加!
従来の散布液量1ℓ/m²から、4分の1の薬剤量・水量でも安定した防除効果が得られます。

2007年5月9日付け

(予防+治療)×耐雨=安定効果

- 予防だけでなく初期病斑の進展も阻止します
- 浸透移行性に優れているのでムラなく効きます
- 降雨による影響を受けにくく安定した効果を示します



- 有効成分／ミクロブタニル…10.0% ●その他の成分／鉱物質微粉、界面活性剤等…90.0%
●性状／類白色水和性粉末 45μm以下 ●毒性／普通物 ●包装／335g×20袋


作物名		適用病害名	希釈倍数 (倍)	散布液量 (ℓ/m ²)	使用時期	本剤及びミクロブタニルを含む農薬の 総使用回数	使用方法
芝	日本芝	カーブラリア葉枯病	1,500	0.25	発病初期	5回以内	散布
		さび病 カーブラリア葉枯病	1,500～2,000	1			
	バミューダグラス	ヘルミントスポリウム葉枯病					
	ブルーグラス	ダラースポット病					
	ベントグラス	ヘルミントスポリウム葉枯病					
		ダラースポット病					

浸透移行性に優れ、 植物体内で菌糸の伸長と生育を阻止します。


DMI剤に分類される殺菌剤です。カビの細胞膜の重要な成分となるエルゴステロールの合成を阻害し、菌糸の伸長、生育の阻止などの効果を示します。浸透移行性に優れるため、植物体内で病気の感染を予防するとともに、初期病斑のさらなる進展を阻止します。

使用適期

ヘルミントスポリウム葉枯病（犬の足跡）の発生時期とラリー水和剤の防除適期（↓）



ダラースポット病の発生時期とラリー水和剤の防除適期（↓）



使用上のポイント

- 病害の発生初期に所定量を加圧噴霧器で散布してください。
- グリーン病害は、プレーヤーのスパイク等で持ち込まれる場合があるので、グリーンだけでなくその周辺の防除もあわせて行うとより効果的です。

使用上・安全上の注意

- ★本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意してください。特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
- ★使用量にあわせ薬液を調製し、使い切ってください。散布器具の洗浄水等は河川等に流さないでください。また、空袋等は、環境に影響を与えないよう適切に処理してください。



★使用前にはラベルをよく読んでください ★ラベルの記載以外には使用しないでください ★本剤は小児の手の届く所には置かないでください ★空袋は施設内外に放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください ★防除日誌を記帳しましょう

本資料は、2007年10月現在の知見を基に作成されています。

製造・販売 **ダウ・ケミカル日本株式会社**
ダウ・アグロサイエンス事業部門
本社／東京都品川区東品川2丁目2番24号 天王洲セントラルタワー
〒140-8617 URL <http://www.dowagro.com/jp>
支店／東京・名古屋・大阪・福岡

取扱