

予防と治療に優れる

シャープな切れ味

ラージパッチ・春はげ症に

リゾトップ®



住化グリーン株式会社

特 長

優れた予防・
治療効果があります。


長い残効性で、
長期間病害の
発生を抑えます。

高い吸収移行性で、
耐雨性に優れます。

適用病害と使用方法


作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	フラメトビルを含む 農薬の総使用回数	使用方法
日本芝	葉腐病 (ラージパッチ)	3000倍	0.3ℓ/m ²	発病初期	3回以内	3回以内	散布
日本芝 (こうらいしば)	疑似葉腐病 (春はげ症)						

使用適期



ラージパッチへの効果

2010年 西日本グリーン研究所



草種：ノシバ 発生：中発生 散布日：4/2
調査：5/11(39日後)、6/3(62日後)に発病面積率を調査

△使用上の注意

- 使用量にあわせ薬液を調製し、使いきってください。
- 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- 誤飲、誤食などの無いよう注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当てを受けさせてください。
使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当てを受けてください。
- 眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください。
- 皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすしてください。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗顔してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 公園等で使用する場合は、散布中および散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のないものが散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。

保管：直射日光を避け、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●小児の手の届く所には置かないでください。

SCG GROUP
住友化学アグログループ



住化グリーン株式会社

〒104-0032 東京都中央区八丁堀4丁目5番4号
TEL.(03)3523-8282 FAX.(03)3523-8071
<http://www.sumika-green.jp>