

農林水産省登録
第16234号

芝生用殺菌剤

ロブテール® フロアブル

有効成分:イプロジオン…23.0%

®は登録商標

特長


- 散布作業が省力的 ●残効性に優れ、雨に強く、効果の発現が早い ●作業表面を汚さず、商品価値を損なわない
- 厚生労働省、環境省による指導方針の対象になっている ●安全性が高い



春はげ症



ラージパッチ



犬の足跡

- 有効成分:イプロジオン 23.0% ●種類名:イプロジオン水和剤 ●有効年限:3年
 ●包装:1ℓ×10瓶 ●毒性:普通物 ●魚毒性:A類(製剤)

特長

1. 散布作業が省力的

薬剤の調製が簡単で、ノズルの噴口がつまる心配がありません。1ℓ入りのポリ容器で持ち運びにも便利です。

2. 残効に優れ、雨に強く、効果の発現が早い

ロブテール水和剤の特長を生かしたオイルベースの製剤で、対雨性及び残効性に優れ、効果の発現は水和剤に比較して早い。

3. 作業表面を汚さず、商品価値を損なわない

1000分の1mmの微粒子の懸濁液なので、汚れが少なく目立ちません。

4. 厚生労働省、環境省による「ゴルフ場使用農薬に係る暫定指導指針」の対象となる

農薬名	イプロジオン	指針値(mg/ℓ)	3
-----	--------	-----------	---

なお、水質目標は上記の指針値の10分の1です

適用病害と使用方法

作物名		適用病害名	希釈倍数(倍)	使用時期	総使用回数*	使用方法
芝	日 本 芝	疑似葉腐病(春はげ症)	600～800	休眠期前及び萌芽期	8回以内	1ℓ/m²散布
		疑似葉腐病(象の足跡)		発病初期		
		葉腐病(ラージパッチ)	500～750			
	バーミューダグラス	ヘルミントスポリウム葉枯病				
	ベントグラス	葉腐病(ブラウンパッチ)	根雪前			
		疑似葉腐病(イエローパッチ)		600～800		
		雪腐小粒菌核病		250～500		
		紅色雪腐病		250		
	ブルーグラス	雪腐小粒菌核病	250～500			
	紅色雪腐病					
ライグラス	雪腐褐色小粒菌核病	500				
紅色雪腐病						

*本剤及びイプロジオンを含む農薬の総使用回数

△使用上の注意事項

- 散布液調製後はすみやかに散布してください。散布水量は芝生がムラなくぬれる程度で、1ℓ/m²にしてください。
- 散布間隔は予防散布の際には10～14日ごととし、7日ごとにしてください。
- 散布後24時間以内に灌水したり、刈り込みをしないでください。
- 肥料との混用散布はできるだけ避けて、薬剤の散布前に肥料を施用してください。
- 散布機によっては、希釈液を強く攪拌した場合、凝集沈殿が発生するおそれがあるので注意してください。また、展着剤を加用することにより、凝集沈殿防止効果が認められます。

1.使用前にはラベルをよく読んでください。 2.ラベルの記載以外には使用しないでください。 3.本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

株式会社 **ユニカス**

本社:〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-5-2 須田町佐志田ビル
 TEL.03-5296-2340(代) FAX.03-5296-2350

大阪支店:☎06-371-3126 札幌営業所:☎011-222-2305 仙台営業所:☎022-261-1319
 名古屋営業所:☎052-951-7235 福岡営業所:☎092-712-8330

取扱い