

期待に応える、幅広い適用。



各種主要病害に卓効

灰色かび病、菌核病をはじめ野菜・果樹の重要病害に卓効を示します。

特長
1

幅広い適用作物

現在46作物に登録があります。

特長
2

他剤耐性菌に高い効果

作用性の異なる他の殺菌剤で耐性菌が問題になっている病害に対しても、安定した高い効果を発揮します。

特長
3

優れた安全性

普通物、A類(原体)で、ミツバチへの影響も認められません。

特長
4



ロゾールのシンボルマークです。

ロゾール®水和剤

®: 登録商標



Bayer CropScience

■適用病害および使用方法

(2004年10月現在の登録内容)

作物名	適用病害名	希釈倍数(倍)	使用時期*	総使用回数*	使用方法
かんきつ	灰色かび病	1,000～2,500	7日	3回	散 布
	黄斑病	1,000～1,500			
	黒腐病	1,000			
りんご	斑点落葉病	1,000～1,500	14日	5回	
なし	黒斑病				
もも	灰星病	1,000	前日	3回	
	ホモブシス腐敗病				
おうとう	灰星病	1,000～1,500	前日	3回	
	黒かび病	1,000			
すもも	灰星病	1,000～1,500	3日	2回	
あんず	灰色かび病		前日		
びわ	灰色かび病、環紋葉枯病		45日		
うめ	果実軟腐症		前日		
キウイフルーツ	灰色かび病		開花期～落花期		
ぶどう	貯蔵病害(灰色かび病)	1,500～2,000	前日	3回	
	灰色かび病	1,000～1,500	開花期～幼果期 (ただし60日前まで)		
	黒とう病	500～1,000			
いちご	灰色かび病、黒斑病、菌核病	1,500	前日	4回	
ピーマン	灰色かび病	1,000～1,500			
	菌核病	1,000			
きゅうり	灰色かび病	1,000～1,500			
	菌核病、つる枯病	1,000			
かぼちゃ	灰色かび病	1,000～1,500		3回	
トマト	輪紋病、斑点病	1,000			
なす	灰色かび病、黒枯病	1,000～1,500		4回	
	菌核病、すすかび病	1,000			
スイカン	菌核病				
メロン	つる枯病	1,000		7日	
キャベツ	菌核病				
はくさい	白斑病、黒斑病	1,000～1,500	14日	3回	
レタス	灰色かび病				
非結球レタス	菌核病、すそ枯病	1,000	21日		
	灰色かび病	1,000～1,500			
たまねぎ	菌核病、すそ枯病	1,000	7日		
	灰色かび病、灰色腐敗病、黒斑病	1,000～1,500			
ねぎ	ボトリチス葉枯症、黒斑病		14日		
	小菌核腐敗病	500			
	白絹病	500～1,000			
わげぎ	ボトリチス葉枯症、黒斑病	1,000～1,500	14日		1㎡当り0.5～1ℓ株元灌注 1㎡当り1ℓ株元灌注
あさつき	小菌核腐敗病	1,000～1,500			
オクラ	黒斑病、灰色かび病	2,000	前日	散 布	
軍用にんじん	灰色かび病、斑点病	1,000～1,500	14日		4回
にんじん	斑点病	1,000～1,500			
	黒葉枯病	種子重量の0.5%	は種前		4回 (は種前1回)
らっきょう	灰色かび病	1,000	30日	3回	散 布
ばれいしょ	菌核病、夏疫病		前日	4回	
	黒あざ病	125	植付前		4回
えだまめ	灰色かび病	1,000	30日	3回	散 布
だいず	菌核病				
いんげんまめ	灰色かび病	1,000～1,500	21日		
	菌核病	500～1,000			
らっかせい	灰色かび病	1,000～1,500	21日		
はとむぎ	葉枯病	1,000			
てんさい	葉腐病	500～1,000	は種時		
	ごま葉枯病	500			
稲 (箱育苗)	苗立枯病(リゾプス菌)		は種時		
	苗立枯病(フザリウム菌)				
畑わさび	苗立枯病(トリコデルマ菌)	500	は種時	4回 (ただし定植後 は3回)	育苗箱 (30×60×3cm) 当り希釈液500mlを 土壌灌注する
	墨入病				
たばこ	1,000(定植時) および 500(定植後)	1,000(定植時) および 500(定植後)	定植時および 定植後 (ただし30日前まで)	4回 (ただし定植後 は3回)	定植時に20時間苗浸漬し、 さらに定植後1㎡当り 3ℓ灌注する
	菌核病		大土寄時		
芋	灰色かび病	1,500～2,000	21日	2回	散 布
芝	葉腐病(ブラウンパッチ)	1,000～1,500	発病初期	8回	1㎡当り1ℓ散布
	ヘルミントスポリウム葉枯病				
芝(日本芝)	葉腐病(ラージパッチ)				
芝(ペントグラス)	グラススポット病				
スターチス	灰色かび病				
			—		散 布

■常温煙霧

適用場所	作物名	適用病害名	10アール当り使用量		使用時期*	総使用回数*	使用方法
			薬量(g)	希釈水量(L)			
温室、ガラス室、 ビニールハウス などの密閉できる 場所	きゅうり	灰色かび病	200	5	前日	4回	常温煙霧
	トマト						
	ミニトマト						
	ぶどう			6	開花期～幼果期 (ただし60日前まで)	3回	

*印は収穫物への残留回避のため、その日まで使用できる収穫(摘採)前の日数と、本剤およびその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示します。

○使用前にはラベルをよく読んでください。○ラベルの記載以外には使用しないでください。○本剤は小児の手の届く所には置かないでください。