



装: 2.5 kg (250g×10袋)

● 成 分:プロジアミン・・・・・・63.0%

■ 人畜毒性: 普通物

- (1) 少ない薬量で、安定して処理層を形成し長期間抑草します。
- (2) 寒地型西洋芝への安全性も高くベントグリーン周りでの使用も可能です。
- (3) 土壌吸着性が高く、蒸気圧が低いため流亡・揮散の心配がありません。

適用雑草 使用方法

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	1 m ² 当り使用量		本剤の		プロジアミンを
				薬量 (g)	希釈水量 (mℓ)	使用回数	使用方法	含む農薬の 総使用回数
日本芝 西洋芝 (バミューダグラス)	_	一年生 イネ科雑草	春期雑草 発生前 (芝生育期)	0.08 ~ 0.1	250 ~ 300	2 回以内	全面土壌散布	2 回以内
		一年生雑草 (キク科を除く)		0.12 ~ 0.24				
			秋期雑草 発生前 (芝生育期)	0.12 ~ 0.16				
西洋芝 (ベントグラス) 西洋芝 (ブルーグラス)	_	一年生 イネ科雑草	春期雑草 発生前	0.06 ~ 0.1	200 ~ 300			
		一年生雑草 (キク科を除く)	(芝生育期)	0.12 ~ 0.24	250 ~ 300			
			秋期雑草 発生前 (芝生育期)	0.12 ~ 0.16				
樹木等	公堤駐道運宅の鉄圏と車路動地り道		雑草発生前	0.16 ~ 0.32	100		*	

※植栽地を除く樹木等の周辺地に全面土壌散布

効果·薬害 等の注意

- 本剤の所定量を所定量の水にうすめ、よくかきまぜてから散布してください。
- 発芽後の雑草に対しては、効果が劣るので必ず雑草発生前に時期を失しないように散布してください。
- キク科雑草に対しては効果がないので、それらの優占する所では使用しないでください。また、ゴルフ場に おいてはグリーンでは使用しないでください。
- 動布に使った器具類は良く水洗いして、他の用途に使用する時は影響のないように注意してください。公園、堤とう等で使用する場合、特に以下のことに注意してください。
- - ・本剤の飛散あるいは流出によって有用植物に薬害が生じることのないよう十分に注意してください。
 - ・散布薬剤の飛散によって自動車やカラートタンの塗装等へ影響を与えないよう、散布地域の選定に注意し、 散布区域内の諸物件に十分に注意してください。
 - ・水源地、養殖池等に本剤が飛散、流入しないよう十分注意してください。
 - ・散布器具、容器の洗浄水及び残りの薬液は河川等に流さず、容器、空き袋等は環境に影響を与えないよう 適切に処理してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場 合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- 激しい降雨の予想される場合は、使用をさけてください。

安全使用 上の注意

- 本剤は眼に対して刺激性がありますので眼に入らないように注意してください。眼に入った場合には直ちに 水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、 顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 公園、堤とう等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者 が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を 払ってください。
- 使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管してください。 (水産動植物に関する注意:通常の使用方法では該当しません。)
- 使用前にラベルをよく読んでください。
- ●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。
- ●使用後の空容器は圃場などに放置せず適切に処理してください。

販売

シンジェンタ ジャパン株式会社

プロフェッショナル・プロダクツ部

〒104-6021 東京都中央区晴海1-8-10 オフィスタワー X 21階 (TEL) 03-6221-3802 (FAX) 03-6221-3899 http://www.syngenta.co.jp/golf

取扱い

※この印刷物の記載内容は2005年8月現在のものです。05年8月作成(ALV5K・KU 02)