

芝地
専用

新商品

UVブロッカー

有害な紫外線をカットして
ベント芝の夏越し対策！！

植物に大きなダメージを与える紫外線

紫外線は直接、生物の遺伝子に作用し損傷を与えます。
夏場の強い紫外線は植物の生育に特に大きなダメージを与えます。

例として、葉焼け・代謝低下・蒸散異常、病害抵抗性の低下等
を引き起こします。

UVブロッカーは特に有害なB領域紫外線をブロックします。

UVブロッカーの作用

過剰に降りそそぐ太陽光線を遮断する。

紫外線による葉緑体構成高分子(タンパク質・脂質・遺伝子)のダメージを少なくする。

過剰な光呼吸を防ぎ、貯蔵炭水化物の消費を抑える。

紫外線により発生する活性酸素を抑える。
活性酸素は光合成を阻害する。

病虫害ストレスや環境ストレスに強くなる。

ターフクオリティーが高くなる。

散布試験

散布直後



3ml / 300ml / m²

10ml / 300ml / m²


一週間後



3ml / 300ml / m²

10ml / 300ml / m²

太陽光線の波長について



使用方法

芝の種類	m ² 当たり	希釈倍率
ベントグラス	2～3ml	100倍

- ・葉面散布してください。(200～300ml/m²)
- ・殺菌剤・殺虫剤・生育抑制剤と混用できません。
- ・完全栄養型クロロベース・マローとの混用で効果がアップします。
- ・ネオスティック(固着剤)との混用で更に効果がアップします。

【安全性】 普通物・魚毒性A類

【包装】 10L入バググインボックス

使用上の注意

1. 使用した器具はすぐに水洗してください。
2. 分離等の変化が起きることがありますので使用前に十分攪拌してください。
3. 直射日光を避けて、なるべく冷暗所に保管してください。
4. 農薬・液肥等と混合する場合、混合の可否は事前に確認してください。
5. UVブロッカーが誤って目や口に入った場合、水でよく洗ってください。



林化学工業株式会社

〒601-8357

京都市南区吉祥院石原堂の後西町31番地

TEL 075-661-3171(代) FAX 075-681-8334