

芝地
専用

紫外線ブロック剤

UVブロッカー

夏場の紫外線は芝に
大きなダメージを与えています。

例えば…

直接、生物の遺伝子に作用し、損傷を与えます。
葉焼け、代謝低下、蒸散異常等を引き起こします。



有害な紫外線を
ブロック!!

濃色タイプ!!
UVブロッカーSP



林化学工業株式会社
Hayashi Chemical Industry Co., Ltd.

UVブロッカーの特長

太陽光線の紫外線領域を主に遮断します！

- 葉緑体構成高分子(タンパク質、脂質、遺伝子)のダメージを少なくします。
- 過剰な光呼吸を防ぎ、貯蔵炭水化物の消費を抑えます。
- 活性酸素を抑えます。
(活性酸素は光合成を阻害し、遺伝子を損傷させます。)
- ターフクオリティーが高くなります。

波長別光量のカット率

(分光光度計による測定)

処理量	紫外線	可視光線		赤外線
	200-400nm	400-600nm	600-800nm	800-1100nm
1mℓ/㎡	40%	20%	30%	20%
2mℓ/㎡	80%	30%	40%	20%

～ 使用方法 ～

使用量	希釈倍率	散水量
1～3mℓ/㎡	100～200倍	100～500mℓ/㎡

- ・葉面散布してください。
- ・完全栄養型クロロベースとの混用で夏越しの活力がアップします。

【包装】10ℓ入りバググインボックス

使用上の注意：

- ・使用した器具はすぐに水洗いしてください。
- ・分離等の変化が起こることがありますので、使用前に十分攪拌してください。
- ・直射日光を避けて、なるべく冷暗所に保管してください。
- ・他資材と混用する場合、あらかじめ使用の可否を確認のうえ、使用してください。
- ・UVブロッカーが誤って目や口に入った場合、水でよく洗ってください。



林化学工業株式会社

Hayashi Chemical Industry Co., Ltd.

〒520-3047 滋賀県栗東市手原6丁目200番地1

TEL 077-585-9985 FAX 077-585-9986

取扱店