

芝生用殺虫剤

農林水産省登録
第25048号



®はシンジェンタ社の登録商標です。

害虫に、
逃げ場なし。



PLINAZOLIN® technology



syngenta®

®

■ 特長

- ◇ IRAC30に属する新規有効成分プリナゾリン®(一般名：イソシクロセラム)を含む殺虫剤です。
- ◇ 耐雨性に優れ、長く安定した防除効果が期待できます。
- ◇ 幅広い殺虫スペクトラムを持ち、特にチョウ目に対し優れた効果を発揮します。

■ 適用病害虫と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イソシクロセラムを含む農薬の総使用回数
芝	シバツトガ スジキリヨトウ コガネムシ類幼虫 シバオサザウムシ	2667 ~ 4000倍	200 mL/m ²	発生初期	2回以内	散布	5回以内

■ 農薬使用者に係る被害防止方法

- [薬剤調製者] 芝：保護眼鏡、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣
- [散布者] 芝：保護眼鏡、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣

■ 効果・薬害等の注意

- 使用前によく振ってから使用してください。
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使い切ってください。
- 散布液調製後はできるだけ速やかに散布してください。
- 害虫抵抗性の発達を防ぐため過度の連用をさけ、可能な限り作用性の異なる薬剤やその他の防除手段を組み合わせ使用してください。
- 蚕に対して影響を及ぼすおそれがあるので、養蚕で使用する桑葉にかからないようにしてください。
- マルハナバチ等に対して影響があるので、マルハナバチ等の巣箱及びその周辺にかからないように注意してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用方法を誤らないよう注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、普及指導センター、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。

■ 安全使用上の注意

- アレルギー性皮膚反応を起こすおそれがあります。
- 公園等で使用する場合には、使用中及び使用後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないように縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
- 蜜蜂に係る注意事項
 - ① ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。
 - ② 関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。
- 水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないこと。また、空容器等は、水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温な場所に密栓して保管してください。

- 使用前にラベルをよく読んでください。
- 本剤は小児の手の届くところにはおかないでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 空袋はほ場などに放置せず、適切に処理してください。

販売

シンジェンタ ジャパン株式会社

プロフェッショナル ソリューション事業本部

〒104-6021 東京都中央区晴海1-8-10 オフィスタワーX21階

TEL:03-6221-3802 FAX:03-6221-3899

取扱い