

酸素で 作物イキイキ!!



酸素供給

エム オー エックス®
M・O・X

液剤10kg入

農家の
みなさまサンソの力で
作物の品質向上に

品質の高い作物を栽培するには、根の生育を旺盛にし、養水分の吸収量を高めてやることが大切です。

M.O.Xで酸素を供給し、品質向上にお役立て下さい。

M.O.Xを散布しますとすみやかに酸素を発生し、作物の栽培に最適な環境をつくり品質向上に役立ちます。

エム オー エックス
M・O・X + 土 → 酸素 + 水

水 稲

■育苗時 100倍液を1箱当り500ml灌水時に施用する。

果 菜

イチゴ・トマト・キュウリ・メロン・ナス・ピーマン・スイカ

■育苗時 100倍液を灌水時に施用する。

■開花後 葉面散布と灌水を隔週毎、交互に行う。

■定植時 100倍液に苗をドブ漬けする。

①100倍液を10a当り200ℓ 葉面散布する。

■定植後 100倍液を10a当り200ℓ 葉面散布する。

②10a当り、10ℓ を灌水する。

葉 茎 菜

レタス・ハクサイ・キャベツ

■育苗時 100倍液を灌水時に施用する。

■結球初期 4～5日おきに100倍液を10a当り300ℓ 葉面散布する。

■定植時 100倍液に苗をドブ漬けする。

ホウレンソウ・シュンギク・コマツナ・オオバ

■播種後 1週間毎に、100倍液を10a当り200ℓ 葉面散布する。

ネギ・ニラ・タマネギ・ニンニク・ミョウガ

■100倍以上に希釈し、根いたみ時や株つかれた時に株元灌水する。

ニラの収穫直後の株に、100倍液を散布する。

花 卉

シクラメン・カーネーション・ラン・キク・トルコキキョウ

●鉢栽培 病葉の摘除後、100倍液を株及び栽培容器全体に散布するか、各植替え毎に灌水してください。底面給水の場合は、300～500倍で給水して下さい。

●ベッド栽培 定植直後に散布する。

■定植後 1～2ヶ月間は2週間毎に、10a当り10ℓ を灌水。

■開花時 根の弱まった時に、1週間毎に10a当り10ℓ を2～3回灌水する。

使用上の注意

M.O.Xとアルカリ性の強い薬剤あるいは、鉄剤との混用はさけて下さい。

(葉面散布は夕方に行うのが効果的です。)

2009.03

代理店



製造元

日本カルオキサイド株式会社

東京都港区芝公園2丁目4番1号

TEL:03-6430-3613(代表)