

兵庫県肥料登録

混合有機質肥料

保証成分量

3.8%

チッソ

2.5%

リンサン

1.3%

カリ

有機栽培への第一歩

vs ゆめ

正味15kg

vs ゆめ

vs ゆめ

有機栽培への第一歩 匠が醸した『VSゆめ』

特 長

- なたね油粕・魚粉・カニガラ・米糠を原料に**VS 34**と**VSあかきん**を混合して、低温発酵にて約一ヶ月間、毎日切り返し作業を行って出来上がったすばらしい肥料です。
- 放線菌・細菌などの生菌数が1gに10億も検索され、これが土の中の微生物群を活性化させます。
- 100g中に約20gの豊富なアミノ酸を含んでいます。

〔分析例〕

財団法人 日本食品分析センター

第203011667-002号 2003年03月 4日

寒天培地	検体1gあたりの生菌数		
	培 養	対象菌	1gあたりの生菌数
抗真菌剤加SCD	30度、3日間、好気	好 気 性 細 菌	1.1×10^9
抗真菌剤加SCD	55度、3日間、好気	高 温 性 細 菌	7.3×10^6
抗真菌剤加SCD	30度、3日間、好気	耐熱性芽胞※	3.1×10^5
DHL	35度、1日間、好気	腸 内 細 菌	100以下
抗真菌剤加MRS	30度、3日間、嫌気	乳 酸 菌	3×10^5
抗真菌剤、ゲンタマイシン加GAM	35度、3日間、嫌気	嫌 気 性 菌	100以下
抗真菌剤加アルブミン	30度、14日間、好気	中温性放線菌	8.4×10^4
抗真菌剤加アルブミン	55度、14日間、好気	高温性放線菌	1×10^2
クロラムフェニコール加PD	25度、7日間、好気	糸 状 菌	4.6×10^6
		酵 母	1.8×10^5



※80度10分間加熱処理後、試験した。

第203011667-001号 2003年02月17日

アミノ酸組成 (g/100g)			
グルタミン酸	3.88	スレオニン	1.07
アスパラギン酸	1.97	セリン	1.05
ロイシン	1.71	イソロイシン	0.98
グリシン	1.41	フェニルアラニン	0.97
プロリン	1.40	チロシン	0.70
アルギニン	1.30	ヒスチジン	0.51
バリン	1.26	シスチン	0.48
アラニン	1.26	メチオニン	0.46
リジン	1.16	トリプトファン	0.32
18種類 合計21.89グラム			

- 長期低温熟成により、施肥当初から肥効がある。

〔窒素無機化特性〕



使用方法例

作物の種類	広さの単位	上手な使用方法及び使用量		追肥(畝間及び株間)
ハウス・果 菜 類	1アール当り	元肥(植溝施用)	30kg~60kg	9~12kg適期
ハウス/軟弱野菜類	〃	元肥(全層施用)	15kg~30kg	9~12kg適期
ハウス・花 キ 類	〃	元肥(全層施用)	15kg~30kg	9~12kg適期
露 地・一 般 作 物	〃	元肥(全層施用)	15kg~30kg	9~12kg適期
果 樹	〃	収穫後三ヵ月後	15kg~30kg	2~3kg適期
		花芽形成二ヵ月後	30kg~60kg	
芝	33m ²	目 土 と 混 合	3~4.5kg	2~3kg適期

※元肥は、定植一ヵ月前に使用してください。 ※播種床は、使用しないでください。

発売元 **アグリジイティ株式会社**

〒651-1301 神戸市北区藤原台北町1丁目18番9号 ☎(078)982-6615 FAX(078)982-3952

製 造 **アグリジイティ株式会社 中町工場**

〒679-1102 兵庫県多可郡多可町中区安楽田字大川原960-4