



農林水産省登録
第22461号



適用拡大
カリフラワー



〈写真はイメージです〉

害虫防除へ パワー全開!!



殺虫剤

アクセル[®] プロアブル

葉菜・根菜・樹木類を食い散らかす各種害虫に効く!



ハスモンヨトウ



オオタバコガ




タマナギンウバ



コナガ



ハイマダラノメイガ



キスジノミハムシ



ヨツモンカメノコハムシ



カブラハバチ



ゴマダラカミキリ



クビアカツヤカミキリ

適用作物

- | | | |
|-------------------|----------|------------|
| ● うめ | ● だいこん | ● なす |
| ● かんきつ | ● かぶ | ● 食用ミニバラ |
| ● キウイフルーツ | ● ねぎ | ● しょうが |
| ● キャベツ | ● ほうれんそう | ● かんしょ |
| ● はくさい | ● アスパラガス | ● さといも |
| ● レタス | ● えだまめ | ● にんじん |
| ● 非結球レタス | ● だいず | ● ごぼう |
| ● ブロッコリー | ● とうもろこし | ● 花き類・観葉植物 |
| ● カリフラワー | ● トマト | ● 樹木類 |
| ● 非結球あぶらな科
葉菜類 | ● ミニトマト | ● たばこ |
| | ● ピーマン | |



日本農薬株式会社

®は日本農薬(株)の登録商標



特長

- 1 難防除害虫や既存剤抵抗性害虫に有効！
- 2 害虫からの食害を停止させます！
- 3 ローテーション防除に活用しやすい！

適用病害虫および使用方法

が2021年12月に適用拡大になりました。

<2021年12月現在の登録内容>

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	メタフルミゾンを含む農薬の総使用回数		
かんきつ	ゴマダラカミキリ	200倍	5～200ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内	※1	3回以内		
	アゲハ類、ヨモギエダシャク、クワノミハムシ	1000～2000倍	200～700ℓ/10a						
キウイフルーツ	ケムシ類	1000倍		100～300ℓ/10a					
うめ	ケムシ類、クビアカツヤカミキリ	1000～2000倍	100～800ℓ/10a						
	ケシキスイ類								
とうもろこし	アワノメイガ	1000倍							
アスパラガス	ツマジロクサヨトウ	1000～2000倍	100～300ℓ/10a						
ごぼう	ハスモンヨトウ	1000倍							
トマト、ミニトマト	ヒョウタンゾウムシ類	1000～2000倍							
ピーマン	オオタバコガ、ハスモンヨトウ								
なす	オオタバコガ								
にんじん	オオタバコガ、ニジュウヤホシテントウ、ハスモンヨトウ								
ねぎ	ハスモンヨトウ、ヒョウタンゾウムシ類	1000倍							
ほうれんそう	シロイチモジヨトウ	1000～2000倍							
	ハスモンヨトウ、シロオビノメイガ	1000倍							
キャベツ	ウリハムシモドキ	1000～2000倍							
	コナガ、アオムシ、キスジノミハムシ	1000～2000倍							
	ハイマダラノメイガ、ハスモンヨトウ								
	オオタバコガ、ヨトウムシ、ウワバ類								
はくさい	コナガ、アオムシ、ハスモンヨトウ	8倍	1.6 ℓ/10a						
	オオタバコガ、ヨトウムシ、ウワバ類	1000倍	100～300ℓ/10a						
	コナガ、アオムシ、ハイマダラノメイガ								
レタス	キスジノミハムシ、ダイコンサルハムシ	1000～2000倍	100～300ℓ/10a						
非結球レタス	ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、カブラハバチ								
ブロッコリー	ハスモンヨトウ、オオタバコガ	1000～2000倍	100～300ℓ/10a						
	ヨトウムシ、ハスモンヨトウ								
カリフラワー	コナガ	1000倍	1.6 ℓ/10a						
	ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、コナガ	8倍							
非結球あぶらな科葉菜類	コナガ、アオムシ、ヨトウムシ	1000倍	100～300ℓ/10a						
	コナガ、キスジノミハムシ	1000倍							
だいこん	ハスモンヨトウ	2000倍	100～300ℓ/10a						
	キスジノミハムシ、ダイコンサルハムシ	1000倍							
かぶ	ハイマダラノメイガ、ヨトウムシ、カブラハバチ	1000～2000倍	2回以内	散 布	2回以内				
	コナガ、アオムシ、キスジノミハムシ	1000倍							
えだまめ	ハスモンヨトウ	1000～2000倍	2回以内	散 布	2回以内				
	だいず	フタスジヒメハムシ				1000倍			
しょうが	ハスモンヨトウ、アワノメイガ	1000～2000倍	3.2 ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	※2	3回以内		
	かんしょ	ハスモンヨトウ、ナカジロシタバ						16倍	0.8～1.6ℓ/10a
さといも	ヨツモンカメノコハムシ	10～16倍	100～300ℓ/10a						
	食用ミニバラ	1000～2000倍							
きく	ハスモンヨトウ	1000倍	100～300ℓ/10a	発生初期	6回以内	散 布	6回以内		
	花き類・観葉植物(きくを除く)	オオタバコガ						1000倍	
さくら	樹木類(さくらを除く)	ケムシ類	1000～4000倍	200～700ℓ/10a	6回以内	散 布	6回以内		
	さくら	ケムシ類	1000倍					成虫発生直前～成虫発生期	※1
		クビアカツヤカミキリ	200倍						
たばこ	さくら	100倍	—	—	—	—	—		
	さくら	1000～2000倍	25～180ℓ/10a					収穫10日前まで	2回以内

※1:主幹から株元に散布 ※2:無人航空機による散布 ※3:木屑排出孔を中心に薬液が滴るまで樹幹注入

■使用上の注意事項

- 植物体への浸透移行による効果は弱いので、かけ残しのないように葉の表裏に十分散布してください。
- クビアカツヤカミキリに使用する場合は、次の点に注意してください。
 - ・樹幹注入で使用する場合は、被害樹の加害痕である木屑排出孔の木屑を除去した後に排出孔内に薬液が滴るまで注入してください。
 - ・散布で使用する場合は、樹幹部および主枝に十分量散布してください。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
 - ・ミツバチの巣箱及びその周辺にかならないようにしてください。無人航空機による散布でそれらに飛散するおそれがある場合には使用しないでください。
 - ・関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。
- 蜜に対して影響があるので、周辺の養蜂にかならないようにしてください。
- 無人航空機による散布に使用する場合は、次の注意事項を守ってください。
 - ①散布は散布機種に準拠して実施してください。
 - ②散布に当たっては散布機種に適合した散布装置を使用してください。

- ③散布中、薬液の漏れのないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行ってください。
- ④散布薬液の飛散によって自動車やカーポートの塗装等に被害を生じるおそれがあるので、散布区域内の諸物件に十分留意してください。
- ⑤散布終了後は次の項目を守ってください。
 - ①使用後の空の容器は放置せず、適切に処理してください。
 - ②機体の散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理してください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。
- 眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをしてください。
- 樹幹注入の際は手袋などを着用してください。
- 街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも使用当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載内容以外には使用しないでください。 ●本剤は小児の手の届くところには置かないでください。

レイミーの農業チャットルーム

ホームページに遊びにきてね！



日農ホームページ



日本農薬株式会社

東京都中央区京橋1丁目19番8号

カスタマーサービス TEL. 03-6361-1414

 ホームページアドレス <https://www.nichino.co.jp/>

2021年12月作成版(ZN)AD12112S