


野菜・花き・稲の害虫防除に

浸透移行型害虫防除剤（フラニコチニル系）



アルバリン[®] 粒剤

有効成分：ジノテフラン…1.0%

毒性：普通物（毒劇物に該当しないものを指すという通称）

（株）アグロ カネショウの登録商標



ワタアブラムシ



シルバーリーフコナジラミ



マメハモグリバエ



ミナミキイロアザミウマ



キスジノミハムシ

決め手は浸透力



新時代をひらく
期待の害虫防除剤。

好評
発売中!

△ 使用上の注意



- つまみ菜・間引き菜には使用しないでください。
- 蜜に対して影響があるので、周辺の農薬にはかからないようにしてください。
- 本剤の株元散布を行う際は、処理直後に灌水してください。
- かんきつに用いる場合は、今期に収穫見込のない苗木に対して株元散布し、処理後は軽く散水してください。なお、本剤を散布してから効果を発揮するまでにある程度の期間を要するため、対象害虫の発生前に予防的に散布してください。
- ふきに使用する場合は、葉に付着した薬剤は払い落としてください。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
 - ① ミツバチ等の巣箱及びその周辺に飛散するおそれがある場合には使用しないでください。
 - ② 関係機関（都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等）に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。
- 水稲に使用する場合には、湛水状態（3cm程度）で田面に均一に散布し、4～5日間は湛水状態を保ち、散布後7日間は落水やかけ流しをしないでください。
- 本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- 空袋は園場などに放置せず、適切に処理してください。

△ 安全使用上の注意

- 街路、公園等で使用する場合は、使用中及び使用後（少なくとも使用当日）に小児や使用に関係のない者が使用区域に立ち入らないよう周囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意してください。
- 魚毒性等・・・水産動植物（甲殻類）に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意してください。散布後は水管理に注意してください。

■ グループ化した作物名に含まれる作物

とうがらし類

ししとう、とうがらし、甘長とうがらし、かぐらなんばん、きだちとうがらし、ハバネロ、ピカンテ

うり類（漬物用）

しろうり、赤毛ウリ、とうがん、はやとうり、食用へちま、食用ひょうたん、ゆうがお、漬物用すいか、漬物用まくわうり、漬物用メロン

つつじ類

アザレア、おおむらさき、くるめつつじ、さつき、しゃくなげ

非結球あぶらな科葉菜類

からしな、ケール、こまつな、さぬきな、さんとうさい、しろな、タアサイ、たいさい、たかな、チンゲンサイ、てごろ菜、のざわな、バクチョイ、ひろしまな、みずな、みぶな、かほくな、なかじまな、べんり菜、あじみな、山形みどりな、ルッコラ、ケールルッコラ、チンゲンルッコラ、その他の非結球あぶらな科葉菜類

なばな類（あぶらな科で茎葉及び花を食用とするもの。ただし、ブロッコリー及び、カリフラワーを除く。）

おおさきな、オータムボエム、かきな、くきたちな、こうさいたい、さいしん、つぼみな、なばな、のらぼうな、はなごごり、みずかけな、めいけな、その他のなばな類

● 使用前にはラベルをよく読んでください。● ラベルの記載以外には使用しないでください。● 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。● 空袋は園場などに放置せず、適切に処理してください。



アグロ カネショウ株式会社

東京都港区赤坂4-2-19

適用作物と使用方法

2018年11月21日現在

作物名	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シノテフランを含む農薬の総使用回数	
稲	ウンカ類、ツマグロヨコバイ ニカメイチュウ、イネドクイムシ カメムシ類	3kg/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	4回以内(育苗箱への処理及び側条施用は 合計1回以内、本田での散布、空中散布、無人 航空機散布は合計3回以内)	
きゅうり	ハモグリバエ類	2g/株	育苗期	1回	株元散布	4回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌 混和は合計1回以内、定植後の株元散布は1回 以内、散布は2回以内)	
	コナジラミ類	1～2g/株			植穴土壌混和		
	アブラムシ類	1g/株	定植時		株元散布		
	ハモグリバエ類、アザミウマ類	2g/株					
	アブラムシ類 コナジラミ類	1～2g/株 1g/株					
うり類 (漬物用)	アザミウマ類	2g/株	定植時	1回	植穴土壌混和	3回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は 2回以内)	
にがうり	アブラムシ類、コナジラミ類	1～2g/株					
メロン	コナジラミ類	2g/株	育苗期		株元散布	3回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土壌 混和は合計1回以内、散布は2回以内)	
	ハモグリバエ類	1～2g/株					
	コナジラミ類	1～2g/株					
	アブラムシ類	1g/株					
	ハモグリバエ類、アザミウマ類	2g/株					
すいか	コナジラミ類	1～2g/株	定植時		株元散布	4回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土 壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は 1回以内、散布は2回以内)	
	アブラムシ類	1g/株					植穴土壌混和
	株元散布						
かぼちゃ	アブラムシ類 コナジラミ類	2g/株	定植時	植穴土壌混和	3回以内(定植時の土壌混和及び育苗トレイ への灌注は合計1回以内、散布は2回以内)		
ズッキーニ	アブラムシ類					1g/株	生育期但し、収穫開始14日前まで
なす	アブラムシ類	1g/株	育苗期	株元散布	3回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土 壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の 株元散布は合計2回以内)		
	ハモグリバエ類	2g/株					
	コナジラミ類	1～2g/株	定植時			植穴土壌混和	
	アブラムシ類	1g/株					
	ハモグリバエ類、アザミウマ類 コナジラミ類 アブラムシ類	1～2g/株 1g/株					
アブラムシ類、コナジラミ類	1g/株	生育期但し、収穫前日まで	2回以内	株元散布			
トマト ミニトマト	コナジラミ類	培土1畧当り10g	は種前	1回	培土混和	5回以内(培土混和及び灌注は合計1回以内、 育苗期の株元散布は1回以内、定植時の土壌 混和は1回以内、散布及び定植後の株元散布は 合計2回以内)	
	ハモグリバエ類	1～2g/株	育苗期		株元散布		
	コナジラミ類		定植時		植穴土壌混和		
	アブラムシ類	1g/株	生育期但し、収穫前日まで		2回以内		株元散布
ピーマン	アブラムシ類	1～2g/株	育苗期	1回	植穴土壌混和	3回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土 壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の 株元散布は合計2回以内)	
	アザミウマ類		定植時				
とうがらし類	アブラムシ類	1g/株	生育期但し、収穫前日まで	2回以内	株元散布	4回以内(育苗期の株元散布及び定植時の土 壌混和は合計1回以内、定植後の株元散布は 1回以内、散布は2回以内)	
	コナジラミ類		育苗期				
	アザミウマ類	1～2g/株	定植時				植穴土壌混和
	アブラムシ類	1g/株	生育期但し、収穫開始14日前まで				株元散布
とうがらし (葉)	アブラムシ類	1g/株	定植時但し、収穫30日前まで	1回	植穴土壌混和	3回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布 は2回以内)	
キャベツ	アブラムシ類	2g/株	育苗期	株元散布	3回以内(育苗期の株元散布、定植時の土壌混 和及び灌注は合計1回以内、散布は2回以内)		
	アオムシ、コナガ	2～3g/株					
	アブラムシ類	2g/株					
	ハイマダラノメイガ	3g/株					
はくさい	アオムシ、コナガ	2～3g/株	定植時	植穴土壌混和	3回以内(定植時の土壌混和及び灌注は合計 1回以内、散布は2回以内)		
	アブラムシ類	2g/株					
	ハイマダラノメイガ	3g/株					
ブロッコリー	アブラムシ類、コナガ	2g/株					
だいこん	アブラムシ類	6kg/10a	は種時	1回	播満土壌混和	5回以内(は種時の播満土壌混和は1回以内、 は種時の全面土壌混和は1回以内、粒剤の散布 は1回以内、水溶剤及び液剤の散布は合計2回 以内)	
	アブラムシ類	4～6kg/10a			全面土壌混和		
	キスジノミハムシ	9～12kg/10a			散布		
	生育期但し、収穫30日前まで	土壌混和					
チンゲンサイ	タネバエ		定植時	1回	土壌混和	3回以内(は種時及び定植時の土壌混和は合計 1回以内、散布は2回以内)	
非結球あぶらな科葉菜類 (チンゲンサイを除く) かぶ	キスジノミハムシ		は種時	1回	播満土壌混和	3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布 は2回以内)	
なばな類	アブラムシ類						
レタス 非結球レタス	アブラムシ類	6kg/10a	は種時	1回	播満土壌混和	3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布 は2回以内)	
	キスジノミハムシ						
	タネバエ						
レタス 非結球レタス	ナモグリバエ	培土1畧当り15g	は種前	1回	培土混和	4回以内(は種前の培土混和は1回以内、育苗 期の株元散布、定植時の土壌混和及び育苗トレ イへの灌注は合計1回以内、散布は2回以内)	
	アブラムシ類、ナモグリバエ	1g/株	育苗期後半		株元散布		
	アブラムシ類	2g/株	定植時		植穴土壌混和		
葉ごぼう	アブラムシ類		は種時	2回以内	全面土壌混和	2回以内(は種時の全面土壌混和は1回以内、 生育期の株元散布は1回以内)	
わけぎ	アザミウマ類	6kg/10a	生育期但し、収穫21日前まで	1回	株元散布	4回以内(定植後の株元散布は1回以内、生育 期の株元灌注は1回以内、散布は2回以内)	
ねぎ	ハモグリバエ類	6～9kg/10a	は種時	2回以内	播満土壌混和	4回以内(は種時の土壌混和、育苗トレイへ の灌注及び定植時の株元散布は合計1回以内、 生育期の株元灌注は1回以内、散布及び定植後 の株元散布は合計2回以内)	
	アザミウマ類		定植時				
	アザミウマ類		生育期但し、収穫3日前まで				
にんじん	ハモグリバエ類	9kg/10a	は種時	1回	播満土壌混和	4回以内(は種時の土壌混和は1回以内、生育 期の株元灌注は1回以内、散布は2回以内)	
ほうれんそう	アブラムシ類	6kg/10a	は種時	1回	播満土壌混和	3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布は 2回以内)	
セルリー	アブラムシ類	2g/株	定植時	1回	植穴土壌混和	3回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布 は2回以内)	
いちご	ワタアブラムシ	0.5～1g/株	収穫30日前まで	3回以内	散布	1回 3回以内	
くわい	アブラムシ類	3kg/10a					
オクラ	アブラムシ類	9kg/10a	生育期但し、収穫開始14日前まで	1回	株元散布	3回以内(株元散布は1回以内、散布は2回以内)	
しょうが	クロバネキノコバエ類	9kg/10a	生育期但し、収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内	
らっきょう	アザミウマ類	6kg/10a	生育期但し、収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内	
実えんどう	ハモグリバエ類	9kg/10a	生育期但し、 収穫開始14日前まで	1回	株元散布	3回以内(株元散布は1回以内、散布は2回以内)	
さやえんどう	アブラムシ類		は種時		播満土壌混和	3回以内(は種時の土壌混和は1回以内、散布は 2回以内)	
ざやいんげん	フタスジヒメハムシ	6kg/10a	定植時		植穴土壌混和	3回以内(定植時の土壌混和は1回以内、散布は 2回以内)	
食用ざく	マデイロコナカイガラムシ	2g/株(但し、10a当り25kgまで)	定植時		播満土壌混和	3回以内(は種時及び定植時の土壌混和は合 計1回以内、散布は2回以内)	
	アブラムシ類	1g/株(但し、10a当り30kgまで)					
しゅんぎく	マメ/ハモグリバエ	2g/株(但し、10a当り30kgまで)	は種時		播満土壌混和	3回以内(は種時及び定植時の土壌混和は合 計1回以内、散布は2回以内)	
ふき	ハモグリバエ類	9kg/10a	定植時	土壌表面散布	3回以内(土壌表面散布は1回以内、散布は 2回以内)		
	アブラムシ類	20kg/10a	定植後～生育期 (草丈20cm頃まで) 但し、収穫45日前まで				
茶	クワシロカイガラムシ	12kg/10a	摘採7日前まで	2回以内	株元土壌混和	2回以内	
かんきつ(苗木)	ミカンハモグリガ	20g/株	育苗期	5回以内	株元散布	5回以内	
さく ガーベラ	マメ/ハモグリバエ	2g/株(但し、10a当り30kgまで)	定植時	1回	植穴土壌混和	5回以内(土壌混和は1回以内)	
	アブラムシ類、コナジラミ類	1g/株(但し、10a当り30kgまで)					
花き類・観葉植物 (さく、ガーベラを除く)	アブラムシ類	20kg/10a	生育期	5回以内	株元散布	5回以内(土壌混和は1回以内)	
	コナジラミ類、アブラムシ類	1g/株(但し、10a当り30kgまで)	定植時	1回	植穴土壌混和		
	アブラムシ類	20kg/10a	生育期	5回以内	株元散布		
つつじ類	ツツジゲンノバイ	6kg/10a	発生初期	5回以内	株元散布	5回以内	
さとうきび	カンシャコ/バナナガカメムシ	6～9kg/10a	生育期但し、収穫45日前まで	2回以内	散布	5回以内(粒剤は2回以内、液剤、水溶剤及び 水和剤は合計3回以内)	

TS19D26(Nアル粒01)