

葉から入って根まで枯らす **除草剤**

サンフーロン®

成分:グリホサートイソプロピルアミン塩41%

10年連続

No.1

※2004農業年度～2013農業年度グリホサートイソプロピルアミン塩41%出荷実績

安心 安全
農林水産省
登録農薬

農林水産省登録
登録番号 第18814号

厳しい審査をクリア

急性毒性試験

慢性毒性試験
(発がん性試験等)

薬効薬害試験

残留性試験



豊富なラインナップ

500ml

2L

5L

10L

20L



土に成分が
残らないので
安心

適用作物と使用方法

平成27年4月現在

1. 散布処理

(使い方: 本剤を水で希釈して、雑草木の茎葉に散布。樹木等では植栽地を除く。)

作物名	適用雑草名	使用時期	10アール当り使用量		本剤の使用回数		
			薬量(mℓ)	希釈水量(ℓ)			
果樹類 (かんきつを除く)	一年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期:草丈30cm以下)	250~500	通常散布	3回以内		
	多年生雑草		500~1000	50~100			
かんきつ	一年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期:草丈30cm以下)	250~500	通常散布	3回以内		
	多年生雑草		500~1000	50~100 少量散布 25~50			
水田作物 (水稲を除く)	一年生雑草	耕起20~10日前まで (雑草生育期)	250~500	50~100	1回		
移植水稲		収穫14日前まで (雑草生育期:草丈30cm以下)	500~1000		2回以内		
直播水稲	一年生雑草		雑草生育期	250~500	50~100	1回	
水田作物 (水田刈跡)	多年生雑草	雑草生育期	500~1000				
水田作物、畑作物 (休耕田)	一年生雑草	雑草生育期 (草丈30cm以下)	250~500	50~100	2回以内		
	多年生雑草	雑草生育期	500~1000				
豆類 (種実、ただし、だいず、 らっかせいを除く)	一年生雑草	耕起前又はは種前まで (雑草生育期)	250~500	少量散布 25~50	2回以内		
だいず		は種10日以前(雑草生育期)				100	1回
		は種後出芽前まで (雑草生育期:草丈30cm以下)					
かんしょ		耕起前(雑草生育期)		100	1回		
ばれいしょ		耕起前又は植付前まで (雑草生育期:草丈30cm以下)					
野菜類 (だいこん、えだまめ、 ねぎ、たまねぎ、トマト、 きゅうり、なすを除く)		耕起7日前まで (雑草生育期:草丈30cm以下)					
だいこん		は種後出芽前 (雑草生育期:草丈30cm以下)		少量散布 25~50	3回以内		
えだまめ		耕起7日前まで (雑草生育期:草丈30cm以下)					
ねぎ		耕起7日前まで(雑草生育期)					
たまねぎ		耕起7日前まで (雑草生育期:草丈30cm以下)		100			
トマト、きゅうり、なす	耕起又は定植7日前まで (雑草生育期:草丈30cm以下)	少量散布 25~50					
麦類 (小麦を除く)	耕起7日前まで(雑草生育期)	100	1回				
小麦	多年生雑草	耕起7日前まで(雑草生育期)	500~750	50~100	3回以内		
雑穀類	一年生雑草	耕起7日前まで (雑草生育期:草丈30cm以下)	250~500	少量散布 25~50	1回		
さとうきび※1	多年生雑草	収穫30日前まで(雑草生育期)	500~1000				
茶	一年生雑草	摘採7日前まで(雑草生育期)	250~500	50	2回以内		
牧草※2	多年生雑草	更新・造成の10日以前 (雑草生育期)	500~1000				
	一年生及び 多年生雑草	は種10日前~は種当日 (耕起整地後)(雑草発生揃期)	250~500				
林木※3	ススキ、ササ類等の 多年生雑草 落葉雑草かん木	生育盛期以降(夏~秋期)	1000	30	1回		
樹木等※4	一年生雑草	雑草生育期(草丈30cm以下)	500	100	3回以内		
	多年生雑草		1000				
	スギナ	雑草生育期	2000	50~100			

2. 注入処理

作物名	適用雑草名	使用時期	希釈倍数	使用液量	使用方法	本剤の使用回数
林木※5	クズ・フジ等の つる類	生育初期	原液 又は 2倍液	つる径2cm以下 0.5mℓ/株 2.1~3.0 1.0 3.1~4.0 1.5 4.1~5.0 2.0 5.1cm以上 適宜増量	つる注入 処理	1回
	竹類	夏期	原液	5~10mℓ/本	竹程 注入処理	

◆適用場所 ※1さとうきび: 圃場内の周縁部、※2牧草: 牧草地、※3林木(散布処理): 造林地(地ごしらえ)、※4樹木等: 公園・庭園・堤とう・駐車場・道路・運動場・宅地・のり面・鉄道等、※5林木(注入処理): 林地・放置竹林(竹類)
●使用前にラベルをよく読んで下さい。●ラベルの記載以外には使用しないで下さい。●本剤は小児の手の届く所に置かないで下さい。

頑固な雑草も根まで
しっかり枯らす



成分が土壤に
残留しないので安心。




人や動物に対しても
高い安全性。



頑固なスギナや
ササ・竹も枯らす。

果樹下草の使用事例



一年生雑草 100倍
イネ科雑草・オオバコ・スズメノカタビラ
ギシギシ・タンポポ 等

多年生雑草 50倍
ツユクサ・クズ・セイタカアワダチソウ
イタドリ・クログワイ・ドクダミ・セリ 等

ササ30倍 スギナ25倍

原液注入処理



竹
2~5ヶ月で枯れます!

希釈表

水量	サンフーロン必要量		
	100倍	50倍	25倍
5ℓ	50mℓ	100mℓ	200mℓ
10ℓ	100mℓ	200mℓ	400mℓ
20ℓ	200mℓ	400mℓ	800mℓ
50ℓ	500mℓ	1ℓ	2ℓ
100ℓ	1ℓ	2ℓ	4ℓ



詳しい製品情報はホームページでもご確認できます

サンフーロン

検索

<http://www.taiseinozai.co.jp/sunfulon>

大成農材株式会社

広島県広島市中区鉄砲町7-8