

線虫防除剤

ネマキック[®]粒剤

®はアグロ カネショウ(株)の登録商標

有効成分：イミシアホス…1.5%

毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)



線虫問題に

NEMAKICK

ケリをつける!!



詳しい製品情報はHPで
ご確認ください。



アグロ カネショウ株式会社
東京都港区赤坂4-2-19

線虫問題にケリをつける!!



線虫防除剤

ネマキック® 粒剤

特長



するどくキック!

線虫の種類を問わず高い効果があります。
※土壌中の微生物に影響を及ぼすことはほとんどありません。



なが〜くキック!

線虫に対し長期間残効性があるので、栽培期間の長い作物にも適しています。



むらなくキック!

土壌中で成分が速やかに拡散し、土壌条件にかかわらず安定した効果が期待できます。

適用作物と使用方法

作物名	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミシアホスを含む農薬の総使用回数	
だいこん	ネグサレセンチュウ	10～15kg/10a	は種前	1回	全面土壌混和	1回	
にんじん		15kg/10a					
ほうれんそう	ネコブセンチュウ、デンサイシストセンチュウ	20kg/10a	は種又は定植前				2回以内 (定植前の土壌混和は1回以内、 生育期の土壌灌注は1回以内)
はくさい	ネコブセンチュウ、ネグサレセンチュウ						
キャベツ	ネグサレセンチュウ、デンサイシストセンチュウ		定植前				
レタス	ネグサレセンチュウ						
いちご							
なす							
ミニトマト	ネコブセンチュウ	15～20kg/10a				定植前	
つるむらさき							
メロン							
すいか							
ピーマン							
きゅうり	ダイズシストセンチュウ	20kg/10a	は種前		1回	植溝土壌混和	
にがうり							
だいず							
えだまめ							
オクラ							
かんしょ	ネコブセンチュウ	15～50kg/10a	は種又は定植前	1回			
ばれいしょ	ネコブセンチュウ、ジャガイモシロシストセンチュウ ネグサレセンチュウ	20kg/10a				植付前	
	ジャガイモシストセンチュウ	15～20kg/10a					
		10kg/10a					
やまのいも	ネグサレセンチュウ	20kg/10a	植付前又は定植前			全面土壌混和	
さといも							
きく							
花き類・観葉植物 (きくを除く)	ネコブセンチュウ ネダニ類		は種前				
みしまさいこ	ネコブセンチュウ			定植前	作条土壌混和		
にら	ネダニ類	10kg/10a					

令和4年1月末現在


上手な使い方

土壌水分は、土壌を握ってくずれない程度の水分量が目安です。



適度な土壌水分!

は種または植付前に土壌に均一に散布してください。



土壌全面に均一散布!

散布後、表層から20cm程度の深さまで、混和ムラがないように丁寧に土壌と混和してください。



深めの耕起がポイント!

※ネマキック粒剤だけの処理でも十分に効果を上げられますが、線虫が多発する条件または栽培期間の長い作物などは他の防除剤との体系処理をおすすめします。

⚠ 効果・被害等の注意

- 全面土壌混和と使用する場合には、所定量の薬剤を圃場全面に均一に散布し、土壌中に均等に分布するようによく混和してください。
- 散布が不均一であったり、混和が不十分な場合には、効果不足や被害を生じるおそれがあるので注意してください。
- 土壌が乾燥している場合は、処理後に十分散水してください。
- だいこん、にんじんを使用する場合、低温期には種する作型には使用しないでください。
- ミツバチ及びマルハナバチに対して影響があるので、ミツバチ及びマルハナバチの巣箱及びその周辺にはかからないようにしてください。
- ★ ミツバチ、マルハナバチを導入する場合は本剤使用後10日以上空けてください。
- 畜に対して、長期間毒性があるので、薬園に飛散しないように注意してください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に被害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除等関係機関の指導を受けることをおすすめします。
- 本剤の使用にあたっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除等関係機関の指導を受けることをおすすめします。
- 空袋は圃場などに放置せず、環境に影響を与えないよう適切に処理してください。

⚠ 安全使用上の注意

- 誤食などのないように注意してください。
- 有機リン剤の解毒剤としては硫酸アトロピン製剤及びPAM製剤があります。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 使用の際は農業用マスク、手袋、長ズボン、長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 保管・・・密封し、直射日光をさけ、食品と区別して冷凍・乾燥した場所に保管してください。

● 使用前にはラベルをよく読んでください。 ● ラベルの記載以外には使用しないでください。 ● 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

TS22A18(Nキック1)