



「効きの速さ これ以外、 いいことあるの?」

神奈川県のカベツ農家・高橋 曠^{こう}さん
効率的な農業と、高品質な作物づくりをいつもめざしている専業農家。

速く効いて、作物にも安心。
あなたの田んぼ、
畑の未来を守る。



農林水産省登録 第16397号

「あります。」

1日で効果が出る。3日間での効きが違う。抜群の速さで雑草を枯らす。
プリグロックスLには、いいこと、まだまだ、いろいろあります。」

- 葉や茎だけに作用し根を残すので、土壌流亡、崩れを起こさず、傾斜地でも安心して使えます。
- 根まで浸透移行しないので、浸透による薬害からあなたの作物を守ります。
- 一年生雑草、多年生雑草、イネ科、広葉を問わず、スギナにも効きます。

安全な登録農薬を使いましょう! 安全使用推進運動展開中
いつも。かならず。農薬は必ずカギをかけて保管しましょう。ラベルをよく読んで正しく使いましょう。

農薬をご使用の際は、ご購入先、または当社ホームページなどで最新の登録内容をご確認下さい。

©はシンジェンタ社の登録商標



「登録内容が広い。だから安心。
だから使いやすい。」



プリグロックスLは、多くの作物・使用場面に登録を持ち、安心して使用できます。

適用
拡大

適用雑草の範囲及び使用方法

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の 使用回数	使用 方法	ジクワットを含む 農薬の総使用回数	バロコートを含む 農薬の総使用回数					
				重量(㎏/10a)	希釈水量(ℓ/10a)									
移植水稻	圃場内の周縁部	一年生雑草	秋期稲刈取後又は春期水田耕起 1ヶ月前から直前まで	800~1000	100~150	1回	雑草茎葉散布	1回	2回以内					
直播水稻			秋期稲刈取後又は春期水田耕起 1ヶ月前から直前まで又は雑草生育期、 は種前14日~は種後7日(イネ出芽前)	600~1000		4回以内		4回以内	4回以内					
麦類(大麦を除く)			は種前又はは種後出芽前					1回	1回					
大麦			雑草生育期					4回以内	4回以内					
さとうきび		多年生雑草	雑草生育期 但し、収穫3日前まで	1000~2000		3回以内		3回以内	3回以内					
未成熟とうもろこし とうもろこし(子実)			畦間処理:雑草生育期 但し、収穫3日前まで 畦間処理:雑草生育期 但し、収穫3日前まで(草丈30cm以下) 畦間処理:雑草生育期 但し、収穫45日前まで(草丈30cm以下) は種前又は植付前	600~1000		5回以内		5回以内	5回以内					
だいず		は種後出芽前 雑草生育期(草丈20cm以下) 畦間処理:雑草生育期(草丈30cm以下) 但し、収穫3日前まで	4回以内			4回以内		4回以内						
ばれいしょ		一年生雑草	萌芽直前 畦間処理:雑草生育期 但し、収穫3日前まで	400~600 200~300(北海道) 400~600		2回以内		2回以内	2回以内					
いも類 (ばれいしょ、かみしよ、やまのいも、さといも、こんにやく、みょうがを除く)			植付前	600~1000		3回以内		3回以内	3回以内					
かんしよ、やまのいも			畦間処理:雑草生育期 但し、収穫30日前まで 植付前											
さといも			畦間処理:雑草生育期 但し、収穫前日まで 植付前											
こんにやく			植付後から萌芽直前 畦間処理:雑草生育期 但し、収穫30日前まで											
果樹類 (かんきつを除く)			多年生雑草	雑草生育期 但し、収穫前日まで		800~1000 1500~2000 1000~2000 800~1000 1500~2000 1000~2000		5回以内	5回以内	5回以内				
かんきつ			スギナ											
		一年生雑草												
		多年生雑草												
圃場内の周縁部		圃場内の周縁部	スギナ、ツクサ	1000~2000		100~150		2回以内	雑草茎葉散布	2回以内	2回以内			
			は種前又は植付前 畦間処理:雑草生育期(草丈30cm以下) 但し、収穫3日前まで											
	一年生雑草		は種前又は植付前 畦間処理:雑草生育期 但し、収穫30日前まで は種前又は植付前 畦間処理:雑草生育期 但し、収穫14日前まで は種前又は植付前 畦間処理:雑草生育期 但し、収穫3日前まで は種前又は植付前 畦間処理:雑草生育期 但し、収穫前日まで は種前又は植付前 畦間処理:雑草生育期 但し、収穫前日まで	600~1000	3回以内		3回以内	3回以内						
			キャベツ、カリフラワー だいこん、ごぼう											
			トマト、きゅうり、ほうれんそう ピーマン、かぼちゃ											
			はくさい、ブロッコリー、レタス たまねぎ、ねぎ、にんじん、なす、 すいか、メロン しょうが											
			アスパラガス											
			スギナ											
			一年生雑草							萌芽前 畦間処理:雑草生育期 但し、収穫21日前まで 萌芽前 畦間処理:雑草生育期 但し、収穫30日前まで 萌芽前 畦間処理:雑草生育期 但し、みょうが (花穂)の収穫30日前まで、花穂を収穫 しない場合にあっては開花期終了まで 畦間処理:雑草生育期(根株養成期) は種前又は植付前 畦間処理:雑草生育期 但し、収穫7日前まで 摘採7日前まで	600~1000	2回以内	2回以内	2回以内
										みょうが(花穂)				
										みょうが(茎葉)				
										うど				
	パセリ													
	やまのいも(むかご)													
	茶													
	桑													
	たばこ													
	樹木類													
水田作物、畑作物(休耕田)	休耕田	多年生雑草	雑草生育期	600~1000 800~1000 600~1000 1000~2000 1500~2000	3回以内	3回以内	3回以内	3回以内						
水田作物 (水田畦畔)	水田畦畔			800~1000 600~1000 1000~2000					4回以内	4回以内	4回以内			
樹木等	公園、庭園 堤防、駐車場 道路、宅地 のり面等			一年生雑草					800~1000	3回以内	3回以内	3回以内		
				スギナ					1000~2000					
		スギナ生育期												

作物名	使用目的	使用時期	使用量(㎡/株)	本剤の 使用回数	使用方法	ジクワットを含む 農薬の総使用回数	バココートを含む 農薬の総使用回数
チューリップ	ウイルス病株の枯殺	第2葉展開期から開花20日後まで	1	1回/罹病株	ウイルス病病株葉への滴下	1回/罹病株	1回/罹病株

- 使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。●使用後の空容器は圃場などに放置せず適切に処理してください。

シンジェンタ ジャパン株式会社

〒104-6021 東京都中央区晴海1-8-10 オフィスタワーX 21階
[ホームページ] <http://www.syngenta.co.jp>